

Cepan, krem 35g



Nasza cena: 18,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	35g
Postać	KREM
Producent	UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Cepan, krem 35g

Krem Cepan powoduje uelastyczenie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie. Zastosowanie preparatu odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu blizn.

Dawkowanie - Cepan, krem 35g

Lek należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.

Krem należy nakładać na bliznę cienką warstwę, lekko masując 2-3razy na dobę. Jeśli lekarz zaleci, niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na 30 do 60 minut. Jest to szczególnie wskazane przy bliznach starych i stwardniałych oraz przykurczach.

W zależności od wieku blizny, leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Składniki - Cepan, krem 35g

100 g kremu zawiera:

- Substancje czynne: Wyciąg z cebuli - 20,0 g, Wyciąg z rumianku - 5,0 g, Sól sodowa heparyny - 5000,0 j.m., Alantoina - 1,0 g
- Substancje pomocnicze: mieszanina laurylosiarczanu sodu i alkoholu cetylostearylowego, parafina ciekła, wazelina biała, emulgator monoglicerydowy (monostearynian glicerolu) glicerol, 4- hydroksybenzoesan metylu, 4- hydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona.

Działania

Zastosowanie leku odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu blizn.

Alantoina, heparyna sodowa oraz wyciągi roślinne wpływają na metabolizm tkanki łącznej i zapobiegają tworzeniu się przerostych blizn.

Substancje czynne leku wzmagają pęcznienie, zmiękczenie i rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu. Zmywalne wodą podłoże kremu sprzyja przenikaniu substancji czynnych w głąb blizny. Krem przyspiesza regenerację tkanki zmniejszając reakcje zapalną, a także znosi uczucie napięcia i świądu.

Wskazania - Cegan, krem 35g

- miejscowe leczenie blizn i bliznowców
- leczenie przykurczy
- leczenie blizn powiek
- leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku

Przeciwwskazania - Cegan, krem 35g

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ze względu na zawartość metylu i propylu parahydroksybenzoesu lek może powodować reakcje alergiczne i wyjątkowo skurcz oskrzeli, natomiast alkohol cetostearylowy może powodować miejscową reakcję skórą.

Przeciwwskazania - Cegan, krem 35g

Na początku stosowania leku mogą wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Reakcje te występują rzadko.

Interakcje

Nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy substancjami czynnymi i pomocniczymi oraz innymi preparatami stosowanymi miejscowo na skórę.

Uwagi

Brak doniesień na temat negatywnych skutków stosowania leku podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.