

# Cevitt Gardło o smaku cytrynowym, 20 tabletek do ssania

Nasza cena: 25,07 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	TABL.D/SSANIA
Producent	Alpen Pharma Ag S.a. Polska [PI]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Cevitt Gardło, tabletki do ssania z witaminą C i cynkiem, 20 szt  
Tabletki do ssania na chrypkę i ból gardła

- Nawilżenie
- Regeneracja
- Ochrona Gardła

### Skład:

Karbomer, ksantan, hialuronian sodu, mannitol, wodorowęglan sodu, sorbitol, kwas cytrynowy, aspartam, witamina C, aromat, cytrynian cynku dwuwodny.

Dzięki obecności substancji pomocniczych witaminy C i dwuwodnego cytrynianu cynku 1 tabletkę Cevitt® Gardło zawiera 1,5 mg cynku i 12,00 mg witaminy C.

### Działanie:

Podczas ssania tabletek Cevitt® Gardło po połączeniu ze śliną w ustach tworzy się hydrożel. Pokrywa on w formie warstwy ochronnej podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej i gardła, przez co pozwala jej się zregenerować oraz uśmierza ból gardła, znosi trudności w przełykaniu i objawy chrypki.

### Wskazania:

Do stosowania w przypadku podrażnień wywołujących kaszel oraz podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz związanych z nimi bólem gardła, utrudnionym przełykaniem oraz chrypką.

### Dawkowanie:

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: należy powoli ssać 1 tabletkę co 4-5 godzin.

Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia: należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek dziennie.

Tabletek do ssania Cevitt® Gardto nie powinno się rozgryzać ani w całości połykać.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować Cevitt Gardto:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik preparatu,
- w przypadku znacząco ograniczonego wytwarzania śliny, np. w przypadku zespołu Sjögrena,
- jeśli pacjent choruje na fenylketonurię, ze względu na to, że tabletki zawierają aspartam stanowiący źródło feniloalaniny.

#### Działania niepożądane:

Nadmierne stosowanie tabletek do ssania Cevitt Gardto może prowadzić do rozrzedzenia się stolca, działać przeczyszczająco.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**