

Chlorchinaldin tabletki do ssania czarna porzeczka, 40 tabletek

Nasza cena: 25,27 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*40
Producent	Pharmaswiss Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CHLORQUINALDOLUM

Opis produktu

Opis

Chlorchinaldin tabletki do ssania czarna porzeczka, 40 tabletek

W zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych:

- dziąseł
- jamy ustnej
- gardła

Skład jakościowy i ilościowy:

1 tabletki do ssania zawiera 2 mg chlorchinaldolu (Chlorquinaldolum).

Substancja pomocnicza: sacharoza (364 mg).

Wskazania do stosowania:

Do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

Dawkowanie i sposób podania:

Co 1-2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg chlorchinaldolu (tj. 10 tabletek do ssania) na dobę. Nie rozgryzać tabletek. Nie stosować podczas posiłku.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



ZASTOSUJ NA INFEKCJĘ GARDŁA
Lek antyseptyczny na infekcje jamy ustnej i gardła*

40 TABLETEK DO SSANIA

*Należy uważać przy stosowaniu antyseptyków miejscowych. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Chlorchinaldin

LEK ANTyseptyczny NA INFEKCJE JAMY USTNEJ I GARDŁA

DZIAŁA MIEJSCOWO PRZECIWBAKTERYJNIE WSKAZANY W LECZENIU GRZYBICY POANTYBIOTYKOWEJ*

*Należy uważać przy stosowaniu antyseptyków miejscowych. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Chlorchinaldin

Chlorchinaldin działa na bakterię *streptococcus pyogenes*, która jest przyczyną

90% bakteryjnych przypadków ostrego zapalenia gardła.^{1,2}

1. Szumilski T. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Antybiotyki. Warszawa: PZWL; 2011. 4-5, 2014.
 2. WHO. The World Health Organization. WHO. Geneva: WHO; 2013. 1982.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Chlorchinaldin

ZASTOSUJ NA INFEKCJĘ GARDŁA
Lek antyseptyczny na infekcje jamy ustnej i gardła*



*Należy uważać przy stosowaniu antyseptyków miejscowych. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować Chlorchinaldinu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.