

Chlorivag globułki dopochwowe x 10



Nasza cena: 30,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	GLOB.DOPOCHW.
Producent	Kadefarm Sp Z O.o. Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Działanie przeciwzapalne:

- Wspomaga produkcję śluzu i utrzymuje prawidłowe nawilżenie błon śluzowych.
- Przyspiesza gojenie i regenerację mikrourazów nabłonka pochwy.
- Zapobiega nawracającym infekcjom bakteryjnym błon śluzowych.
- Utrzymuje prawidłowe środowisko pochwy.

Działa przeciwzapalnie i zapobiega infekcjom, przyspiesza gojenie uszkodzeń nabłonka.

Chlorivag zalecany jest do długotrwałego stosowania profilaktycznego u pacjentek po leczeniu przeciwzapalnym, ze skłonnością do częstych infekcji (spowodowanych także przez aktywność sportową, pływanie w basenie, częste kąpiele w wannie), w okresie menopauzy i przyjmujących antykoncepcję hormonalną.

Chlorivag działa zapobiegawczo i leczniczo w chorobach o charakterze zapalnym, infekcyjnym oraz z nieprawidłowymi zmianami w nabłonku pochwy. Przeciwdziała nawrotom stanów zapalnych śluzówki pochwy. Stabilizuje wydzielanie śluzu, wspomagając tym samym odbudowę i utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Rekomendowany w przypadku zaczerwienienia, swiędu, pieczenia i podrażnienia, spowodowanych różnymi typami chorób dróg rodnych o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Stosowany jako terapia wspomagająca przed i po ginekologicznych zabiegach chirurgicznych.

Wskazania do stosowania:

- uzupełnienie terapii przeciwzapalnej pochwy i sromu,
- profilaktyka przeciw nawrotom chorób śluzówki pochwy o charakterze zapalnym, dystroficznym i infekcyjnym,
- terapia wspomagająca w odbudowie prawidłowego nawilżenia śluzówki pochwy,

- silne działanie łagodzące w przypadku świądu, zaczerwienienia, podrażnienia, spowodowanych różnymi typami chorób w okolicy pochwy i sromu,
- terapia wspomagająca przed i po ginekologicznych zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie:

Pacjentki po leczeniu przeciwzapalnym: 2 razy dziennie 1 globulka, przez dwa dni; następnie 1 globulka co drugi dzień, przez około dwa tygodnie.

Pacjentki ze skłonnością do częstych infekcji, w okresie menopauzy, stosujące antykoncepcję hormonalną: dwa razy w tygodniu 1 globulka.

W terapii przewlekłej, powyżej 1,5 miesiąca, utrzymywać dawkowanie dwa lub trzy razy w tygodniu 1 globulkę.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.