

Chlorprothixen Zentiva 50 mg 50 tabletek

Nasza cena: 7,85 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	LECIVA PRAGA CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	CHLORPROTHIXENUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Leczenie psychoz endogennych i organicznych ze stanami pobudzenia ruchowego i agresywnością, niepokoju i bezsenności w nerwicach i zaburzeniach psychosomatycznych, psychoz alkoholowych. W chirurgii - premedykacja dla wyciszenia pacjenta i mniejszej reakcji neurovegetatywnych oraz w celu zapobiegania wymiotom pooperacyjnym.

Dawkowanie:

Dawkowanie indywidualne w zależności od wskazań i tolerancji pacjenta. Nerwice: zazwyczaj 15 mg 1-3x/dobę. Zaburzenia psychiatryczne: zazwyczaj 50-100 mg 2-4x/dobę. Dawkę dobową należy podzielić tak, aby większą dawkę podawać przed snem. Dzieci i młodzież: Raczej nie stosuje się chloroprotiksenu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak dobrze kontrolowanych badań.

Działanie:

Chloroprotiksenu to pochodna tioksantenu o budowie zbliżonej do pochodnych fenotiazyny. Jego działanie przeciwpsychotyczne polega na blokowaniu postsynaptycznych receptorów dopaminergicznych w mózgu, a także na blokowaniu receptorów alfa-adrenergicznych i hamowaniu uwalniania większości hormonów podwzgórza i przysadki.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 50 mg chloroprotiksenu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne tioksantenu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Upośledzenie hemopoezy, nieprawidłowości w obrazie krwi, depresja OUN (w tym depresja OUN w zatruciu lekami lub alkoholem), stany śpiączkowe, zapaść krążeniowa. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:

Ryzyko rozwoju działań niepożądanych zwiększa się przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek chloroprotyksenu. Ryzyko to jest również większe u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku. Do najczęściej występujących działań niepożądanych należy uczucie zmęczenia, niedociśnienie ortostatyczne, senność aż do apatii często występują na początku leczenia dużymi dawkami.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.