

## Choligrip Na Noc, syrop, 100 ml



Nasza cena: 3,90 zł

### Opis słownikowy

Postać	SYROP
Producent	Glaxo Smith Kline Pharm.s.a.
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Psychotrop

### Opis produktu

#### Opis

Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia.

#### Dawkowanie - Choligrip Na Noc, syrop, 100 ml

Dorośli: zalecana dawka wynosi 20ml syropu (załączona miarka napełniona do zaznaczonego poziomu 20ml lub 4 łyżeczki po 5 ml) i należy przyjmować ją bezpośrednio przed snem. Jedną dawkę Choligrip na noc podaje się tylko jeden raz w ciągu doby, bezpośrednio przed snem. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

#### Składniki - Choligrip Na Noc, syrop, 100 ml

20 ml syropu zawiera: 1000mg paracetamolu (Paracetamolum), 20mg chlorowodoru prometazyny (Promethazini hydrochloridum), 15mg bromowodoru dekstrometorfanu (Dextromethorphanii hydrobromidum).

#### Działania

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Prometazyna jest lekiem przeciwhistaminowym zmniejszającym katar i ułatwiającym oddychanie; ma również wyraźne działanie uspokajające. Dekstrometorfan jest lekiem przeciwkaszlowym; zmniejsza nasilenie suchego i drażniącego kaszlu towarzyszącego często przeziębieniom i nieżytom dróg oddechowych.

#### Wskazania - Choligrip Na Noc, syrop, 100 ml

Przeznaczony jest do stosowania przed snem w celu zmniejszenia objawów utrudniających prawidłowy sen. Stosuje się do leczenia objawów występujących w przeziębieniach i grypie, w tym bólu głowy i innych dolegliwości bólowych, bólu gardła, gorączki, kataru oraz suchego, drażniącego kaszlu.

## Przeciwwskazania - Choligrip Na Noc, syrop, 100 ml

Przeciwwskazania - Choligrip Na Noc, syrop, 100 ml Stwierdzona nadwrażliwość na paracetamol, dekstrometorfan, prometazynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Niewydolność nerek lub wątroby. Niewydolność oddechowa lub okoliczności stwarzające ryzyko jej wystąpienia (przewlekła choroba obturacyjna dróg oddechowych lub zapalenie płuc, atak astmy lub zaostrzenie astmy). Przyjmowanie inhibitorów monoaminoooksydazy (MAO) i okres do 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu. Produktu nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu. Należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Schorzenia wątroby zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby przez paracetamol, z przewlekłym lub utrzymującym się kaszlem, występującym np. w astmie lub rozedmie płuc, lub gdy jest to kaszel z odksztuszeniem wydzieliny, z jaskrą zamykającego się kąta przesączania, z rozrostem gruczołu krokowego, z zatrzymaniem moczu, z padaczką, ze schorzeniami serca i naczyń.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**