

## Cholinex, 32 pastylki do ssania



Nasza cena: 25,13 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*32
Postać	PASTYLKI
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CHOLINI SALICYLAS

### Opis produktu

#### Opis

### Cholinex, 32 pastylki

Lek **Cholinex** stosować do ssania w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, bólu i obrzęku gardła towarzyszącym stanom zapalnym oraz jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje.

#### **Dawkowanie:**

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia; przeciętnie ssać po 1 pastylce 4-6 razy na dobę. Dawkowanie u dzieci w wieku 6-12 lat - maksymalnie do 4 pastylek na dobę. Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1-2 dni należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Składniki:**

Substancja czynna: choliny salicylan 150 mg oraz substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, glukoza jednowodna, olejek miętowy.

#### **Działania:**

Działa miejscowo:

- przeciwzapalnie
- przeciwbólowo
- zwiększając wydzielanie śliny, przez co wspomaga efekt przeciwzapalny.

#### **Wskazania:**

- Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła
- Ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym
- Jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje
- W leczeniu stomatologicznym stanów zapalnych dziąseł i tkanek przyzębia.

#### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz pozostałe składniki preparatu. Nie podawać u osób z

żylakami przełyku, ze względu na zagrożenie krwotokiem.

**Przeciwwskazania:**

Przewlekłe podawanie salicylanu choliny (powyżej 6,7 g/dobę co odpowiada 45 pastylkom) może prowadzić do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Tak jak w przypadku innych salicylanów, należy zasięgnąć porady lekarskiej przed zastosowaniem leku u osób cierpiących na stany zapalne przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz u osób chorych na astmę oskrzelową. Ze względu na zawartość cukru wskazana jest ostrożność przy podawaniu osobom z cukrzycą oraz ze skłonnością do próchnicy. U dzieci poniżej 12 roku życia wskazania do stosowania salicylanów powinny być ustalone przez lekarza ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reya. Ciąża i karmienie piersią O stosowaniu preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**