

Cholinex Junior Smak Malinowy, pastylki, 16 sztuk



Nasza cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*16
Postać	PASTYLKI
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Pastylki Junior Cholinex smak malinowy suplement diety zostały stworzone w oparciu o specjalnie wyselekcjonowane składniki ziołowe, które działają:

- nawilżająco
- osłaniająco
- i tonizująco

na błony śluzowe gardła, krtani i jamy ustnej. Smak malinowy.

Działanie:

- Rumianek działa kojąco na delikatną i wrażliwą śluzówkę gardła
- Szałwia odświeża, działa ściągająco, oczyszczająco i tonizująco
- Tymianek wspomaga wydzielanie śluzu, dzięki czemu likwiduje uczucie suchości i nawilża wysuszone błony śluzowe górnych dróg oddechowych, ułatwia odkrztuszanie
- Prawoślaz powleka i osłania błony śluzowe gardła przed działaniem czynników drażniących, zmniejsza częstotliwość odruchu kaszlowego
- Mięta działa orzeźwiająco i daje uczucie świeżości.
- Witamina C jest znana z właściwości wspomagających naturalne mechanizmy obronne organizmu, dzięki czemu pomaga złagodzić przebieg przeziębienia. Dlatego od lat wykorzystywana jest w tradycyjnych recepturach i domowych sposobach na przeziębienie.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia:

Ssać 1 pastylkę, co trzy godziny.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu wynosi 4 pastylki,
tj. 60 mg witaminy C.

Dzieci od 4 do 6 roku życia:

Ssać 1 pastylkę, co trzy godziny.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu wynosi 3 pastylki,
tj. 45 mg witaminy C.

Skład:

Cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy - regulator kwasowości, proszek malinowy 0,45%, witamina C (L - askorbinian sodu), wyciąg suchy z rumianku, aromat malinowy, wyciąg suchy z liścia mięty pieprzowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.