

# Cholinex pastylki bez cukru, 16 sztuk



Nasza cena: 18,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*16
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CHOLINI SALICYLAS

## Opis produktu

### Opis

Preparat stosowany w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

### Dawkowanie - Cholinex pastylki bez cukru, 16 sztuk

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia przeciętnie ssać po 1 pastylce 4 do 6 razy na dobę. Jeżeli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni należy skonsultować się z lekarzem.

### Składniki - Cholinex pastylki bez cukru, 16 sztuk

(1 pastylka): salicylan choliny 150 mg, substancje pomocnicze: izomalt, amlitol ciekły, aspartam (E951), acesulfam potasowy, olejek miętowy.

### Działania

Substancja czynna pastylek Cholinex - salicylan choliny działa miejscowo: przeciwzapalnie zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, przeciwbólowo, oraz zwiększając wydzielanie śliny, przez co wzmacnia efekt przeciwzapalny.

### Wskazania - Cholinex pastylki bez cukru, 16 sztuk

Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła, ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym; jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła; w leczeniu stomatologicznym stanów zapalnych dziąseł i tkanek przyzębia.

### Przeciwwskazania - Cholinex pastylki bez cukru, 16 sztuk

Nadwrażliwość na salicylany i inne leki z grupy NLPZ oraz pozostałe składniki preparatu. Żylaki przełyku, nadwrażliwość na składniki preparatu.

## Przeciwwskazania - Cholinex pastylki bez cukru, 16 sztuk

Rzadko: reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry i wysypki, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu lub trudności w oddychaniu), uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, krwawienia).  
Bardzo rzadko u dzieci poniżej 12 rż. istnieje możliwość wystąpienia zespołu Reye'a.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**