

Chronada 200 mg + 250 mg 90 kapsułek

Nasza cena: 65,20 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,2G+0,25G
Opakowanie	*90
Postać	KAPS.TWARDE
Producent	BIOIBERICA S.A.U. HISZPANIA [ES]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CHONDROITIN, GLUCOSAMINUM

Opis produktu

Opis

Chronada 200 mg + 250 mg, 90 kapsułek twardych (Chondroityny sodu siarczan + Glukozaminy chlorowodorek)

Spis treści

- Podstawowe Informacje
- Wskazania do stosowania
- Przeciwwskazania
- Dawkowanie
- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Interakcje z innymi lekami i żywieniem
- Ciąża i karmienie piersią
- Stosowanie u dzieci i młodzieży
- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
- Działania niepożądane/ skutki uboczne
- Przechowywanie leku
- Dodatkowe informacje

Podstawowe Informacje

Lek Chronada należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i przeciwreumatycznych wydawanych na receptę. Lek ma zastosowanie w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego u dorosłych z umiarkowanym i silnym bólem. Substancjami aktywnymi w leku są chondroityny sodu siarczan, wytworzony z chrząstki wołowej, oraz glukozaminy chlorowodorek.

Dokładny skład leku:

- Każda kapsułka twarda zawiera: 200 mg chondroityny sodu siarczanu oraz 250 mg glukozaminy chlorowodoru.
- Pozostałe składniki to: stearynian magnezu.

Nazwa leku:	<u>Chronada</u>
Skład 1 kapsułki to:	<u>Substancje czynne:</u> chondroityny sodu siarczanu - 200 mg glukozaminy chlorowodoru - 250 mg
	<u>Pozostałe składniki:</u> stearynian magnezu
Wygląd tabletek:	Twarda żelatynowa kapsułka Kolor kapsułki: truskawkowy
Opakowanie	Opakowanie zawiera 90 tabletek(6 blistrów po 15 szt)
Zastosowanie:	leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego u dorosłych
Dawkowanie:	Zalecana dzienna dawka leku to 2 kapsułki przyjmowane 3 razy na dobę.
Ciąża i karmienie piersią	Nie stosować
Dzieci i młodzież	Nie stosować
Interakcje z alkoholem	brak danych w ulotce
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn	Nie należy prowadzić jeżeli wystąpią zawroty głowy po przyjęciu leku
Najczęstsze skutki uboczne	<ul style="list-style-type: none">• ból głowy• biegunka,• nudności,• niestrawność,• wzdęcia (gazy)
Przechowywanie leku	temperatura poniżej 30°C; chronić przed wilgocią, z dala od dzieci

Wskazania do stosowania

Lek ma zastosowanie w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego u dorosłych z umiarkowanym i silnym bólem, dla których odpowiednie jest leczenie skojarzone z chondroityny sodu siarczanem oraz glukozaminy chlorowodorkiem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku w przypadku :

- uczulenia na chondroityny siarczan, chlorowodorek glukozaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- W przypadku alergii na owoce morza, ponieważ glukozamina jest pozyskiwana z owoców morza.

Dawkowanie

Jak przyjmować lek Chronada?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zalecana dzienna dawka leku to 2 kapsułki przyjmowane 3 razy na dobę.

Kapsułki należy połykać w całości bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana liczba kapsułek mogą wystąpić bóle głowy, zawroty głowy, dezorientacja, bóle stawowe, nudności, wymioty lub biegunka, ale prawdopodobne jest, że nie wystąpią żadne z tych objawów. W razie wystąpienia dowolnego z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki leku Chronada

Można przyjąć pominiętą dawkę w dowolnym momencie, ale nie należy stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę.

Przerwanie stosowania leku Chronada

Może nastąpić nawrót objawów. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić z lekarzem lub farmaceutą stosowanie leku Chronada w przypadku pacjentów:

- z nieprawidłową tolerancją glukozy
- z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
- z poważnymi chorobami serca

Interakcje z innymi lekami i pożywieniem

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku Chronada z :

- Lekami zapobiegającymi krzepnięciu krwi. Chronada może wzmacniać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryna, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol i fluindion) ze względu na zawartość glukozaminy.
- Lekami stosowanymi w zakażeniach (antybiotyki takie jak tetracyklina, chloramfenikol lub penicylina).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Chronada z jedzeniem i pićm:

Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, podczas posiłków lub po ich spożyciu. Jeśli pacjent jest podatny na problemy żołądkowe, lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku w przypadku karmienia piersią. Nie wiadomo, czy substancje aktywne preparatu przenikają do mleka matki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpią zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane. Ogólnie działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie leczenia tym lekiem, są łagodne i przemijają wraz z zakończeniem stosowania leku.

Jeśli jakiegokolwiek z działań niepożądanych, które wystąpiły u pacjenta, mogą być poważne lub jeśli wystąpią działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy:

- Zakażenie górnych dróg oddechowych,
- zakażenie dróg moczowych
- bóle w klatce piersiowej.

Jakie są częste skutki uboczne podczas przyjmowania leku Chronada (dotyczy do 1 na 10 osób):

- ból głowy
- biegunka,
- nudności,
- niestrawność,
- wzdęcia (gazy)

Jakie są rzadko występujące skutki uboczne podczas przyjmowania leku Chronada (dotyczy do 1 na 1000 osób):

- zaburzenia smaku
- ból brzucha
- refluks żołądkowo-przełykowy
- zaparcie, zgaga, wzdęcie brzucha
- skurcze mięśni, ból kończyny
- zmęczenie
- zakażenie górnych dróg oddechowych lub dróg moczowych
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
- nieprawidłowy wynik badania moczu

Działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów leczonych wyłącznie chondroityny siarczanem - występujące bardzo rzadko (1 na 10 000 osób):

- obrzęk,
- zatrzymywanie płynów
- reakcja alergiczna

Działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów leczonych wyłącznie glukozaminy chlorowodorkiem - występujące rzadko (1 na 100 osób):

- zaczerwienienie
- wysypka na skórze oraz świąd

Działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów leczonych wyłącznie glukozaminy chlorowodorkiem - częstość występowania nieznana :

- obrzęk twarzy, języka lub gardła
- pokrzywka, obrzęk w obrębie kostek, nóg i stóp
- zawroty głowy, wymioty
- pogorszenie wyników badania krwi u pacjentów chorych na cukrzycę

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie leku

Leku nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Lek chronić przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności

Dodatkowe informacje

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku ANDROTOP znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.