

Citabax 20 28 tabletek 20 mg

Nasza cena: 20,56 zł

Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	RANBAXY POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CITALOPRAMUM

Opis produktu

Opis

Wskazania - Citabax 20 28 tabletek 20 mg

Leczenie depresji, a także profilaktycznie w nawracających zaburzeniach depresyjnych oraz w leczeniu zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii.

Dawkowanie - Citabax 20 28 tabletek 20 mg

Lek stosowany doustnie. Dawka oraz częstotliwość dawkowania powinna zostać ustalona indywidualnie z lekarzem. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, bez względu na przyjmowanie posiłków. Podczas stosowania preparatu nie należy pić alkoholu. W przypadku odstawienia leku, należy to robić stopniowo. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18 lat. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z właściwościami opisanymi w ulotce. Nie stosować leku po terminie ważności. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Działanie

Przeciwdepresyjne

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera 20 mg cytalopramu.

Przeciwwskazania - Citabax 20 28 tabletek 20 mg

Nadwrażliwość na cytalopram lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, przyjmowanie jednocześnie innych leków

przeciwdepresyjnych, a także doustnych leków przeciwzakrzepowych, ciąża i karmienie piersią.

Działania niepożądane

Nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, łysienie, wysypka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, biegunka, nudności i zmęczenie, zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia, zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała, zapalenie wątroby, a także nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego, niepokój, nerwowość, zaburzenia orgazmu u kobiet, agresja, zachowania samobójcze, senność, bezsenność, zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia smaku, rozszerzenie źrenic oraz zaburzenia widzenia, szumy uszne, częste ziewanie, bóle mięśni i stawów, zatrzymanie moczu. U mężczyzn może powodować impotencję, zaburzenia wytrysku, niezdolność do wytrysku, u kobiet krwotok miesięczkowy, krwotok maciczny. Nagłe odstawienie leku prowadzi do objawów odstawiennych, tj. zawroty głowy, zaburzenia snu, pobudzenie lub niepokój, nudności, wymioty, bóle głowy, biegunkę, kołatanie serca, chwiejność nastrojów, zaburzenia widzenia. Zaleca się stopniowo odstawić lek przez zmniejszanie dawki.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.