

# Claritine Active, 5mg + 120 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 6 sztuk



Nasza cena: 19,38 zł

## Opis słownikowy

Dawka	5MG+120MG
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	*6
Postać	Tabletki
Producent	SCHERING-PLOUGH LABO N.V. BELGIA [BE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LORATADINUM, PSEUDOEPHEDRINUM

## Opis produktu

### Opis

## Claritine Active, 5mg + 120 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 6 sztuk

### Dawkowanie

1 tabletkę dwa razy na dobę (co 12 godzin). Tabletkę należy połknąć w całości popijając szklanką wody.

### Skład

Substancje czynne: 5mg loratadyna, 120mg pseudoefedryny siarczan,

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian

Skład otoczkowy: guma akacjowa, cukier granulowany, wapnia siarczan dwuwodny, wapnia siarczan bezwodny, guma różana, kwas olejowy, mydło neutralne, talk, celuloza mikrokrystaliczna, tytanu dwutlenek, wosk biały, wosk Carnauba.

### Działanie

Przeciwalergiczne i obkurczające błonę śluzową nosa.

-Loratadyna pomaga zmniejszyć objawy alergiczne poprzez zahamowanie działania w organizmie substancji zwanej histaminą

-Pseudoefedryna pomaga zmniejszyć przekrwienie błony śluzowej nosa.

## Wskazania

Wskazany w leczeniu objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa takich jak: wyciek z nosa, kichanie, swędzenie i łzawienie oczu.

## Przeciwwskazania

Nie stosować:

- jeśli u pacjenta występuje uczulenie na loratadynę, pseudoefedrynę, którykolwiek z pozostałych składników leku.
- jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, wysokie ciśnienie tętnicze, choroba serca lub naczyń krwionośnych
- jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił udar mózgu lub występuje ryzyko udaru mózgu
- jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni leki: przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)
- u dzieci poniżej 12 lat
- u kobiet w ciąży

Nie stosować:

- \* jeśli u pacjenta występuje uczulenie na loratadynę, pseudoefedrynę, którykolwiek z pozostałych składników leku.
- \* jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, wysokie ciśnienie tętnicze, choroba serca lub naczyń krwionośnych
- \* jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił udar mózgu lub występuje ryzyko udaru mózgu
- \* jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni leki: przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)
- \* u dzieci poniżej 12 lat
- \* u kobiet w ciąży

## Możliwe działania niepożądane

Bezsenność, suchość w jamie ustnej, pragnienie, nerwowość, senność, depresja, pobudzenie, brak apetytu, zawroty głowy, częstoskurcz, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy, uczucie zmęczenia, dezorientacja, drżenie, zwiększona potliwość, nagłe zaczerwienienie twarzy, zaburzenia smaku, wzmożone łzawienie, szумы w uszach, kołatanie serca, krwawienie z nosa, zaburzenia w oddawaniu moczu, świąd, wysokie ciśnienie krwi, kaszel, trudności w oddychaniu, nieprawidłowa czynność wątroby, zatrzymanie moczu, łysienie.

## Uwagi

Więcej na temat alergii dowiedzą się Państwo z artykułu "Jesienne alergie."

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**