

Claritine Allergy, syrop, 60 ml



Nasza cena: 24,61 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------|
| Opakowanie | 60ml |
| Postać | SYROP |
| Producent | BAYER POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | LORATADINUM |

Opis produktu

Opis

Claritine Allergy należy do grupy leków przeciwhistaminowych, które zmniejszają objawy uczulenia, zapobiegają działaniom wywołanym przez substancje nazywane histaminą, która wytwarzana jest w organizmie.

Dawkowanie - Claritine Allergy, syrop, 60 ml

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat – dawkowanie zależy od masy ciała: Masa ciała wieksza niż 30 kg: 10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami.

Masa ciała 30 kg lub mniejsza:

Nie jest wskazane stosowanie leku Claritine Allergy.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby:

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg: 10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) co drugi dzień.

Składniki - Claritine Allergy, syrop, 60 ml

5 ml syropu zawiera:

substancję czynną: 5 mg loratadyny, substancje pomocnicze: glikol propylenowy, glicerynę, kwas cytrynowy jednowodny, sodu benzoosan, sacharozę, aromat brzoskwinowy, wodę oczyszczoną.

Działania

Claritine Allergy łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takie jak: kichanie, swędzenie i wodnista wydzielina z nosa, swędzenie i pieczenie oczu.

Lek może być również stosowany w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (swędzenie, zaczerwienienie skóry). Działanie lecznicze polegające na złagodzeniu tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz do normalnego snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania - Claritine Allergy, syrop, 60 ml

Kiedy nie stosować leku Claritine Allergy:

-jeśli pacjent ma uczulenie na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-u kobiet w ciąży. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania Claritine Allergy należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

Przeciwwskazania - Claritine Allergy, syrop, 60 ml

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u dzieci w wieku od 2 do 12 lat są: ból głowy, nerwowość i zmęczenie. Do najczęstszych działań niepożądanych u dorosłych i młodzieży należą: senność, ból głowy, zmniejszony apetyt i problemy ze snem, jak również zmęczenie, suchota w ustach, nudności (mdłości), zapalenie błony śluzowej z ołdka i wysypka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić takie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka, obrzęk). Jeżeli wystąpią takie reakcje alergiczne, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano bardzo rzadko również inne działania niepożądane: zawroty głowy, nieregularne lub szybkie bicie serca, rozstrój z ołdka, zaburzenia czynności wątroby, wypadanie włosów.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Uwagi

Więcej na temat alergii dowiedzą się Państwo z artykułu "Jesienne alergie."

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.