

Clemastinum Hasco syrop 100 ml

Nasza cena: 7,74 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Opakowanie | 100 ml |
| Postać | SYROP |
| Producent | HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek na receptę pełnopłatny |
| Substancja czynna | CLEMASTINUM |

Opis produktu

Opis

Clemastinum Hasco syrop 100 ml

Wskazania:

Lek przepisywany jest przez lekarza w celu łagodzenia objawów alergii skórnych, zapalenia błony śluzowej nosa na tle alergicznym, kichanie i łzawienie spowodowane alergią.

Dawkowanie:

Dawkę ustala lekarz indywidualnie na podstawie wieku pacjenta oraz stanu zdrowia. W przypadku syropu jest to zazwyczaj dawka sugerowana przez producenta, czyli:

- dzieci w wieku 1-3 lat: 0,25-0,5 mg klemastyny (tj. 2,5-5 ml syropu) 2x/dobę, rano i wieczorem
- dzieci w wieku 3-6 lat: 0,5 mg klemastyny (tj. 5 ml syropu) 2x/dobę, rano i wieczorem
- dzieci w wieku 6-12 lat: 0,5-1 mg klemastyny (tj. 5-10 ml syropu) 2x/dobę, rano i wieczorem.
- dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 1 mg klemastyny (tj. 10 ml syropu) 2x/dobę, rano i wieczorem.

Maksymalna dobową dawkę klemastyny dla osób dorosłych wynosi do 6 mg (tj. do 60 ml syropu/dobę).

Działanie:

Lek ma działanie przeciwhistaminowe, przeciwalergiczne i przeciwświądowe.

Skład:

10 ml syropu zawiera 1 mg klemastyny w postaci klemastyny fumaranu.

Przeciwwskazania:

Istnieją przeciwwskazania, aby nie stosować Clemastinum, takie jak:

- nadwrażliwość na klemastyne
- nadwrażliwość na substancję pomocniczą
- jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy
- wiek poniżej 1-go roku życia

Działania niepożądane:

Wszystkie działania niepożądane umieszczone są na ulotce dołączonej do leku. Jeśli wystąpią u Ciebie niepokojące działania niepożądane, to skonsultuj się z lekarzem.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.