

# Clobederm 0,05% maść 25 g

Nasza cena: 15,72 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,05%
Opakowanie	25 g
Postać	MASC
Producent	JELFA S.A.JELEŃ GÓRA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CLOBETASOLUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Produkt jest wskazany do stosowania:

- w krótkotrwałym miejscowym leczeniu stanów zapalnych skóry,
- w łojotokowym zapaleniu skóry,
- w wyprysku kontaktowym,
- w atopowym zapaleniu skóry,
- w łuszczycy zadawnionej,
- w liszaju rumieniowatym,
- w rumieniu wielopostaciowym,
- w toczniu rumieniowym dyskoidalnym,
- w liszaju płaskim o nasilonym świądzie,
- w wyprysku zliszajowaciłym.

### Dawkowanie:

- maksymalny czas stosowania leku w sposób ciągły nie powinien przekraczać 2 tygodni,
- w momencie kiedy pacjent zauważy poprawę, należy przerwać leczenie,
- produkt należy delikatnie wcierać w zmienione chorobowo miejsca 1 do 2 razy na dobę.

### **Działanie:**

- przeciwzapalne,
- przeciwświądowe,
- przeciwalergiczne,
- obkurczające naczynia krwionośne.

### **Skład:**

1 g maści zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu.

### **Przeciwwskazania:**

#### **Nie należy stosować produktu Clobederm:**

- w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeniach skóry,
- w trądziku zwykłym,
- w trądziku różowatym,
- w zapaleniu skóry dookoła ust,
- po szczepieniach ochronnych,
- w przypadku nadwrażliwości na propionian klobetazolu lub inne glikokortykosteroidy,
- w nadwrażliwości na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,
- w świądzie odbytu i narządów płciowych,
- pod opatrunkiem okluzyjnym,
- u dzieci poniżej 12 lat,
- długotrwanie.

### **Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane.

#### **Najczęściej przejawiają się one poprzez:**

- zmiany trądzikopodobne,
- plamica posteroïdowa,
- zahamowanie wzrostu naskórka,

- pieczenie,
- świąd,
- podrażnienie,
- wysypka,
- zaniki tkanki podskórnej,
- suchość skóry,
- nadmierne owłosienie lub łysienie,
- odbarwienie lub przebarwienie skóry,
- zanik i rozstępy skóry,
- teleangiektazje,
- stan zapalny skóry dookoła ust,
- zapalenie mieszków włosowych skóry.

Należy zauważyć, iż działania niepożądane mogą występować jedynie u części pacjentów. U każdego z nich mogą objawiać się one w inny sposób. Warto również zauważyć iż działania niepożądane mogą w ogóle nie występować. Jeżeli pacjent zauważy u siebie którekolwiek z działań niepożądanych powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Wszelkie niezbędne informacje na temat stosowania leku oraz możliwych działań niepożądanych zostały zawarte w ulotce informacyjnej.

**Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**