

Clostilbegyt 50 mg 10 tabletek

Nasza cena: 60,04 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,05G
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	EGIS PHARMACEUTICALIS LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CLOMIFENUM

Opis produktu

Opis

Clostilbegyt 50 mg 10 tabletek

Clostilbegyt 50 mg jest to lek stosowany w leczeniu niepłodności u kobiet spowodowanej brakiem owulacji.

Dawkowanie:

Dawkowanie należy ustalić indywidualnie dla każdej pacjentki w zależności od wrażliwości (reaktywności) jajników. W przypadku cyklicznych krwawień zaleca się rozpoczęcie leczenia w 5. dniu cyklu (lub w 3. dniu w razie wczesnej owulacji-faza folikularna trwająca krócej niż 12 dni). W przypadku braku miesiączek leczenie można zacząć w dowolnym dniu. Schemat I: 50 mg dziennie przez 5 dni, w tym czasie należy sprawdzić reakcję jajników za pomocą badania ginekologicznego lub badań laboratoryjnych. Owulacja następuje zazwyczaj między 11. a 15. dniem cyklu. Schemat II: należy zastosować go w razie niepowodzenia schematu I. Dawkę dobową 100 mg należy podawać przez 5 dni, zaczynając od 5. dnia następnego cyklu. Jeśli nie uda się wywołać owulacji można jeszcze raz powtórzyć ten sam schemat postępowania (podając ponownie dawkę 100 mg). Wrazie dalszego braku owulacji, po trzech miesiącach przerwy można przeprowadzić dodatkowy, trzymiesięczny cykl leczenia. Potem nie zaleca się dalszego powtarzania leczenia. Nienależy zwiększać dawki powyżej 100 mg dziennie ani wydłużać czasu podawania powyżej 5 dni. W zespole policystycznych jajników, ze względu na możliwość hiperstymulacji, dawka początkowa powinna być mniejsza (25 mg na dobę). W przypadku braku miesiączki po antykoncepcji, należy zastosować dawkę dobową 50 mg; zwykle skuteczne jest pięciodniowe leczenie, nawet już podczas pierwszego cyklu leczenia.

Nadwrażliwość:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Choroby wątroby, zaburzenia czynności wątroby
- Cięża

- Torbiel jajnika (z wyjątkiem zespołu policystycznych jajników)
- Pierwotna niedoczynność przysadki
- Zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy.
- Krwawienia z macicy o nieznanego przyczynie
- Zaburzenia widzenia (występujące od dawna lub ostatnio).
- Nowotwory hormonozależne.
- U pacjentek z dysgenezą jajników, po menopauzie lub w innej sytuacji, w której przewiduje się brak odpowiedzi.

Skład:

Każda tabletkę zawiera 50 mg klomifenu cytrynianu (Clomifeni citras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu 100 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletkę.

Substancje pomocnicze:

Żelatyna, magnez ustearnian, kwas stearynowy, talk, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna (100mg).

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.