

Codipar, 500mg, 50 tabletek



Nasza cena: 9,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	Glaxo Wellcome S.a.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Dawkowanie - Codipar, 500mg, 50 tabletek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Zazwyczaj stosuje się u dzieci: 6 - 12 lat - 1/2 tabletki co 4 do 6 godzin, nie częściej niż 4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Paracetamolu nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni, a u dorosłych dłużej niż 10 dni bez zalecenia lekarza.

Składniki - Codipar, 500mg, 50 tabletek

(1 tabletką): paracetamol 500 mg. Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, skrobia ziemniaczana, powidon K-30, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa.

Działania

CODIPAR jest lekiem zawierającym paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

Wskazania - Codipar, 500mg, 50 tabletek

- bóle głowy,

- bóle stawów, mięśni, kości,
- bolesne miesiączki,
- bóle zębów,
- a także w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Przeciwwskazania - Codipar, 500mg, 50 tabletek

Uczulenie na paracetamol lub inne składniki preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, choroba alkoholowa.

Przeciwwskazania - Codipar, 500mg, 50 tabletek

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wysypka, rumień), zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), zaburzenia czynności wątroby i nerek.

Sporadycznie: methemoglobinemia, agranulocytoza, trombocytopenia.

Uwagi

W czasie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.