

Coffecorn forte 1 mg + 100 mg, 12 tabletek drażowanych

Nasza cena: 23,33 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	Tabletki
Producent	FILOFARM BYDGOSZCZ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ERGOTAMINUM, COFFEINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Coffecorn forte 1 mg + 100 mg jest to lek stosowany na napady migreny, - bóle głowy pochodzenia naczyniowego, jeżeli środki przeciwbólowe są nieskuteczne.

Skład:

1 tabletki drażowana zawiera 1 mg ergotaminy winianu (Ergotamini tartras) oraz 100 mg kofeiny bezwodnej (Coffeinum) oraz substancje pomocnicze, w tym: 179,925 mg sacharozy i 34,7 mg laktozy.

Wykaz substancji pomocniczych:

- Metyloceluloza
- Skrobia ziemniaczana
- Karboksymetyloskrobia sodowa
- Laktoza jednowodna
- Magnezu stearynian
- Talk

Skład otoczki:

- Sacharoza,
- Błękit brylantowy FCF (E-133),
- Syrop ziemniaczany,

Skład masy połyskowej:

- Olej rzepakowy,
- Wosk pszczeni żółty,
- Nipagina M,
- Etanol 96%

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Aby produkt był maksymalnie skuteczny powinien być przyjmowany w momencie wystąpienia pierwszych objawów napadu migreny. Produkt należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku. Doustnie zwykle od 1 do 2 tabletek drażowanych w momencie wystąpienia pierwszych objawów prodromalnych. Następnie, jeśli jest to konieczne w celu przerwania napadu migreny zażywać 1 tabletkę drażowaną, co pół godziny (maksymalnie 4 tabletki drażowane na dobę lub 8 tabletek drażowanych na tydzień). Należy zachować, co najmniej 4 dniowy odstępow między kolejnymi dawkami maksymalnymi. W przypadku innych bólów głowy pochodzenia naczyniowego należy zażywać 1 tabletkę drażowaną 2 razy na dobę, nie dłużej niż cztery dni.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu, kofeinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego
- Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.
- Choroby naczyń obwodowych takie, jak: choroba Raynauda, zarostowe zapalenie naczyńkrwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył, zaawansowana miażdżycza naczyń.
- Po zabiegach chirurgicznych na naczyniach.
- Niedotlenienie mięśnia sercowego.
- Przebyty zawał serca.
- Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
- Choroby nerek i wątroby.
- Posocznica.
- Jaskra.
- Ciąża i okres karmienia piersią.
- Jednoczesne leczenie inhibitorami izoenzymu CYP3A cytochromu P450 oraz lekami zwężającymi naczynia krwionośne.

Przedawkowanie:

Objawy po przedawkowaniu:

znużenie, dezorientacja, depresja, senność, majaczenie, ciężka duszność, obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego, szybkie i słabe tętno, drętwienie kończyn, utrata przytomności, wstrząs i śmierć.

Leczenie:

jeśli pacjent jest przytomny należy prowokować wymioty. Jeśli jest w stanie śpiączki zastosować płukanie żołądka. Nie ma specyficznej odtrutki. W przypadku silnego skurczu naczyniowego stosuje się leki rozszerzające naczynia takie jak: nitroprusydek sodu, tołazolinę oraz heparynę i (lub) dekstran.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.