

Coffepirine tabletki od bólu głowy, 6 szt.



Nasza cena: 1,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Producent	MARCMED POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, COFFEINUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w bólach różnego pochodzenia o słabym lub średnim natężeniu.

Dawkowanie - Coffepirine tabletki od bólu głowy, 6 szt.

Doustnie.

Zazwyczaj stosuje się 1 tabl. od 2 do 6 razy na dobę nie częściej niż co 4 godziny. Nie należy przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Nie stosować na czczo. Tabl. należy połączyć popijając dużą ilością płynu.

Składniki - Coffepirine tabletki od bólu głowy, 6 szt.

1 tabletkę zawiera jako substancje czynne 450mg kwasu acetylosalicylowego i 50mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: skrobie ziemniaczaną, talk.

Działania

Preparat o skojarzonym działaniu składników: przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i analeptycznym.

Wskazania - Coffepirine tabletki od bólu głowy, 6 szt.

Preparat stosowany w bólach różnego pochodzenia o słabym lub średnim natężeniu (np. migrena, bóle głowy, bóle reumatyczne, bóle mięśniowe, nerwobóle, ból zęba), w stanach gorączkowych, objawowym leczeniu grypy i przeziębień.

Przeciwwskazania - Coffepirine tabletki od bólu głowy, 6 szt.

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub salicylany. Występujące w przeszłości napady astmy oskrzelowej - po salicylanach lub innych NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i(lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, skaza krwotoczna, dna moczanowa. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach ≥ 15 mg tygodniowo. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci do 12 rż.

Przeciwwskazania - Coffepirine tabletki od bólu głowy, 6 szt.

Mogą wystąpić: bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego (jawne lub utajone), choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacje, ból i zawroty głowy, szumy uszne, bezsenność, niepokój ruchowy, zwiększone ryzyko krwawienia, wydłużenie czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego, trombocytopenia, pokrzywka, odczyny skórne, reakcje anafilaktyczne, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca.

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na leki z grupy salicylanów i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmę oskrzelową, czynną chorobę wrzodową, zaburzenia krzepnięcia krwi, polipy nosa, małą liczbę płytek krwi. Gdy przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, leki obniżające ciśnienie krwi, doustne leków przeciwcukrzycowe, stosujesz wkładki wewnątrzmaciczne, jeśli przyjmujesz leki będące pochodnymi fluorochinolonu. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.