

## Coldrex Maxgrip C, 12 tabletek



Nasza cena: 15,40 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	Tabletki
Producent	Smith-Kline-Beecham
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Preparat polecany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy.

#### Dawkowanie - Coldrex Maxgrip C, 12 tabletek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

Jeśli objawy choroby nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

#### Składniki - Coldrex Maxgrip C, 12 tabletek

(1 tabletki): paracetamol 500 mg, kofeina 25 mg, chlorowodorek fenylefryny 5 mg, wodzian terpinu 20 mg, kwas askorbinowy 30 mg.

Substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą, skrobię rozpuszczalną, talk, kwas stearynowy, powidon, potasu sorbinian, sodu laurylosiarczan, żółty barwnik (E110).

#### Działania

- przeciwbólne i przeciwgorączkowe,
- obkurczające naczynia krwionośne i udrażniające przewody nosowe
- łagodnie pobudzające,
- wykrztuśne,
- uzupełnianie niedoboru witaminy C, które mogą wystąpić w pierwszych dniach choroby.

Tabletki Coldrex MaxGrip C zawierają następujące substancje czynne: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kofeinę, wodzian terpinu i witaminę C.

Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

Fenylefryna - obkurcza naczynia krwionośne i udrażnia przewody nosowe

Kofeina - nasila działanie przeciwbólne paracetamolu

Wodzian terpinu - działa wykrztuśnie

Witamina C - witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.

## Wskazania - Coldrex Maxgrip C, 12 tabletek

Coldrex stosuje się w dolegliwościach związanych z grypą i przeziębieniem takich jak: bóle głowy, dreszcze, bóle kostne i mięśniowe, niedrożność przewodów nosowych, bóle zatok i gardła.

## Przeciwwskazania - Coldrex Maxgrip C, 12 tabletek

Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi w swoim składzie paracetamol. Nie należy stosować preparatu Coldrex u osób z nadwrażliwością na paracetamol, fenylefrynę, kofeinę, wodzian terpinu lub witaminę C.

Do innych przeciwwskazań należą:

- ciężka niewydolność wątroby i nerek
- nadczynność tarczycy,
- cukrzyca,
- nadciśnienie tętnicze krwi,
- tętniaki,
- schorzenia serca,
- ciąża, laktacja,
- podwyższone ciśnienie śródgałkowe,
- przerost gruczołu krokowego,
- niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- choroba alkoholowa,
- przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, beta -adrenolityków,
- przyjmowanie inhibitorów MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

- skórne reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka), napad astmy oskrzelowej oraz inne reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego
- ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej
- ze strony układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, bledność skóry,
- ze strony układu oddechowego: zaburzenia oddychania
- ze strony układu moczowego: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych
- ze strony ośrodkowego układu nerwowego: lęk, niepokój, nerwowość, bezsenność
- zaburzenia w obrazie krwi.

## Uwagi

Ciaża i karmienie piersią:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**