

Coldrex Maxgrip Lemon, 10 saszetek



Nasza cena: 27,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP.Z O.O POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, PHENYL

Opis produktu

Opis

Preparat polecany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy.

Dawkowanie - Coldrex Maxgrip Lemon, 10 saszetek

Wsypać jedną saszetkę do kubka z gorącą wodą. Mieszać aż do rozpuszczenia. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: Jedna saszetka do 4 razy na dobę. Nie przekraczać dawki 4 saszetek w ciągu 24 godzin. Nie należy podawać dzieciom poniżej 12 roku życia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż trzy dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Składniki - Coldrex Maxgrip Lemon, 10 saszetek

Każda saszetka zawiera 5g preparatu o składzie: Paracetamol 750 mg Chlorowodorek fenylefryny 10 mg Kwas askorbinowy 70 mg Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, cytrynian sodu, skrobia kukurydziana, sodu cyklamianian, sodu sacharynę, bezwodną krzemionkę koloidalną, aromat cytrynowy, kurkuminę.

Działania

- przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
- obkurczające naczynia krwionośne i udrażniające przewody nosowe;
- uzupełnianie niedoboru witaminy C, które występuje w czasie grypy i przeziębienia.

Wskazania - Coldrex Maxgrip Lemon, 10 saszetek

Leczenie objawów grypy, przeziębienia takich jak: bóle głowy, dreszcze, bóle gardła, niedrożność przewodów nosowych, bóle zatok.

Przeciwwskazania - Coldrex Maxgrip Lemon, 10 saszetek

Nie należy stosować preparatu u osób z nadwrażliwością na paracetamol, fenylefrynę lub witaminę C. Nie należy stosować preparatu w następujących przypadkach:

- ciężka niewydolność wątroby i nerek;
- nadczynność tarczycy;
- cukrzyca;
- nadciśnienie tętnicze krwi; nie wolno stosować u pacjentów z tętniakami;
- schorzenia serca;
- leczenie beta adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi;
- podwyższone ciśnienie śródgałkowe;
- przerost gruczołu krokowego;
- niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
- choroba alkoholowa.

Regularnie zażywany paracetamol nasila działanie przeciwzakrzepowe warfaryny oraz innych pochodnych kumaryny z jednoczesnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia krwawień. Stosowanie z lekami hamującymi rozkład paracetamolu w wątrobie (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę; z lamotryginą zmniejsza jej stężenie we krwi. Metoklopramid lub domperidon przyspieszają, a cholestyramina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Podczas jednoczesnego stosowania fenylefryny z inhibitorami MAO występuje zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Fenylefryna może zmniejszać skuteczność leków blokujących receptory β -adrenergiczne i leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem w przypadku ciąży i laktacji. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.