

Coldrex MaxGrip smak cytrynowy, (1000 mg + 10 mg + 40 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 14 saszetek



Nasza cena: 35,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*14
Postać	Saszetki
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, PHENYL

Opis produktu

Opis

Coldrex MaxGrip smak cytrynowy, (1000 mg + 10 mg + 40 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 14 saszetek

Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym to kompleksowy lek do rozpuszczania w gorącej wodzie, który zwalcza nawet najbardziej uciążliwe objawy przeziębienia i grypy takie jak:

- Gorączka
- Ból głowy
- Dreszcze
- Katar
- Ból gardła

Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym zawiera kombinację trzech substancji aktywnych w rozgrzewającej formie saszetek do rozpuszczania. Paracetamol zmniejsza gorączkę i ból, a fenylefryna udrożnia nos. Lek zawiera także witaminę C, której niedobory mogą często wystąpić na początku zakażeń wirusowych. **Coldrex MaxGrip** zawiera maksymalną dostępną bez recepty dawkę paracetamolu.*
 * Maksymalna dawka paracetamolu w jednej saszetce dostępna bez recepty, **Coldrex MaxGrip** zawiera największą dawkę paracetamolu spośród produktów Coldrex.

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytym nosa (katarzem).

Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym dzięki wieloskładnikowej formule działa na 5 objawów grypy lub przeziębienia:

- gorączkę,
- dreszcze,
- bóle głowy,
- ból gardła,
- katar.

Paracetamol – działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,

Fenylefryna – obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe,

Witamina C – witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.

Składniki

1 saszетка zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 10 mg chlorowodorku, fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), 40 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).

Substancje o znanym działaniu: 1 saszетка zawiera: 3,73 g sacharozy i 129,15 mg sodu.

Jak stosować

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jedna saszетка co 4 do 6 godzin. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani nie więcej niż 4 saszетки na dobę.

Sposób podawania

Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość jednej saszетки do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Jeżeli objawy choroby utrzymują się pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol, substancje zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa lub innymi lekami o podobnym mechanizmie działania. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa.

Przyjmowanie zydowudyny, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu.

Podmiot odpowiedzialny

Perrigo Poland Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.