

Concor Cor 1,25 28 tabletek 1,25 mg

Nasza cena: 16,75 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,25MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	MERCK KGAA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	BISOPROLOLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory.

Dawkowanie:

W chwili rozpoczęcia leczenia fumaranem bisoprololu pacjenci powinni być w stabilnym stanie (bez ostrej niewydolności). Zaleca się, aby leczenie przewlekłej niewydolności serca było prowadzone przez lekarza z doświadczeniem w tej dziedzinie. Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga fazy doboru dawki leku. Zalecana dawka startowa wynosi 1,25 mg raz/dobę. W zależności od indywidualnej tolerancji dawkę zwiększa się do 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg, i 10 mg raz/dobę w odstępach 2-tyg. lub dłuższych. Jeśli zwiększanie dawki nie jest tolerowane można kontynuować leczenie mniejszą dawką. Maks. zalecana dawka wynosi 10 mg raz/dobę. Zaleca się ściśle monitorowanie objawów czynności życiowych (czynność serca, ciśnienie krwi) oraz objawów nasilenia niewydolności serca w trakcie fazy doboru dawki. Modyfikacja leczenia: w razie złej tolerancji maksymalnej zalecanej dawki można rozważyć stopniowe zmniejszenie dawki leku.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 1,25 mg fumaranu bisoprololu.

Przeciwwskazania:

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów: z ostrą niewydolnością serca lub w okresach dekomensacji niewydolności serca, które wymagają stosowania dożylnych terapii inotropowej; we wstrząsie kardiogenym; z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez stosowania rozrusznika serca); z zespołem chorego węzła zatokowego; z blokiem węzłowo-przedsionkowym; z bradykardią z czynnością serca poniżej 60 skurczów/min. przed rozpoczęciem leczenia z niedociśnieniem (skurczowe ciśnienie <100 mm Hg) z ciężką

astmą oskrzelową lub ciężkimi przewlekłymi obturacyjnymi zaburzeniami czynności płuc; w późnym stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda; z nie leczonym guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy; w kwasicy metabolicznej; ze znaną nadwrażliwością na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Badania dodatkowe: (rzadko) podwyższony poziom triglicerydów, podwyższony poziom enzymów wątrobowych (ALAT, ASPAT). Zaburzenia serca: (bardzo często) bradykardia; (często) pogorszenie niewydolności serca; (niezbyt często) zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Zaburzenia układu nerwowego: (często) zawroty głowy, ból głowy; (rzadko) omdlenia. Zaburzenia oka: (rzadko) zmniejszony wypływ łez (istotne gdy pacjent nosi soczewki kontaktowe); (bardzo rzadko) zapalenie spojówek. Zaburzenia ucha i błędnika: (rzadko) zaburzenia słuchu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub wywiadem wskazującym na obturacyjne choroby płuc; (rzadko) alergiczny nieżyt nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.