Serwis Internetowy Świat Leku
Górnicza 2, Łęczyca
+48 24 721 05 34

CONDYLINE (IMP.ROW.BULGARIA) 3,5ML

Nasza cena: 50,16 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	3,5ML
Postać	PLYN
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PODOPHYLLUM PELTATUM

Opis produktu

Opis

Skład:

1 ml roztworu na skórę zawiera 5 mg podofilotoksyny (Podophyllotoxinum).

Wskazania do stosowania:

- Kłykciny kończyste

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie:

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.

Produkt leczniczy Condyline należy stosować 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni. Leczenie można powtarzać co tydzień przez okres nie dłuższy niż 5 kolejnych tygodni.

Sposób podawania:

Condyline nanosi się na kłykciny za pomocą załączonego aplikatora, a następnie pozostawia do wyschnięcia.

Należy unikać kontaktu produktu ze zdrową skórą.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu leczniczego:

- w czasie ciąży i karmienia piersią;

- u dzieci;

- jednocześnie z innymi produktami zawierającymi podofilinę, ze względu na działanie toksyczne;

- w nadwrażliwości na podofilotoksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Działania niepożądane:

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe

Objawy te związane są głównie z działaniem leczniczym produktu i występują zwykle w drugiej lub trzeciej dobie leczenia, gdy rozpoczyna się martwica kłykciny.

Niezbyt często: obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka u niektórych pacjentów z rozległymi kłykcinami zlokalizowanymi na wewnętrznej stronie napletka.

Objawy miejscowe można złagodzić, wdrażając na kilka dni leczenie przeciwzapalne, np. kortykosteroidem do stosowania miejscowego.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.