

# Contrahist 5 mg 28 tabletek

Nasza cena: 9,59 zł

## Opis słownikowy

Dawka	5MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	ADAMED SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	LEVOCETIRIZINE

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania przez pacjentów w celu leczenia objawowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.

### Dawkowanie:

Zazwyczaj zaleca się stosowanie produktu w dawce 5 mg (1 tabletkę powlekana). Dawka leku ustalana jest zawsze indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie występujących objawów oraz nasilenia choroby. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

### Działanie:

Zmniejsza dolegliwości alergiczne.

### Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodoru, co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.

### Przeciwwskazania:

Produkt jest zabroniony do stosowania przez pacjentów u których występują dolegliwości związane z:

- nadwrażliwością na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- dziedziczną nietolerancją galaktozy,
- niedoborem laktazy (typu Lapp),
- zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
- ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

## Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować działania niepożądane takie jak:

- anafilaksja,
- agresja,
- pobudzenie,
- drgawki,
- zaburzenia widzenia,
- kołatanie serca,
- duszność,
- nudności,
- zapalenie wątroby,
- obrzęk naczynioruchowy,
- trwały wyprysk polekowy,
- świąd,
- wysypka,
- pokrzywka,
- bóle mięśni,
- zwiększenie masy ciała,
- nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

Jeżeli podczas stosowania leku wystąpi którekolwiek z powyższych działań należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.