

Contril syrop, 120 ml



Nasza cena: 21,82 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Opakowanie | 120 ml |
| Postać | SYROP |
| Producent | US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | LEVODROPROPIZINUM |

Opis produktu

Opis

Contril syrop, 120 ml

Wskazania

Contril wskazany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Syrop przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 2 lat oraz osób dorosłych.

Smak wiśniowy.

Na jakie objawy?

- Suchy, uporczywy kaszel w przebiegu infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, np. infekcji wirusowych
- Męczący suchy kaszel utrudniający zasypianie lub spożywanie posiłków
- Uporczywy kaszel (nieproduktywny) o charakterze napadowym wyczerpujący dziecko i otoczenie
- Kaszel poinfekcyjny (nieproduktywny)

Właściwości

- Hamuje odruch kaszlu w drogach oddechowych, nie wpływając bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy.
- Posiada korzystny profil bezpieczeństwa (działania niepożądane występują bardzo rzadko).
- Nie wchodzi w interakcje z lekami stosowanymi w chorobach oskrzeli i płuc.
- Może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 2 lat oraz osób dorosłych.

Skład

10 mL syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny (Levodropropizinum).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie należy stosować produktu leczniczego u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).
- Ciąża i laktacja

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.