

Convafort, 40 drażetek



Nasza cena: 9,39 zł

Opis słownikowy

Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CONVALLARIA MAJALIS

Opis produktu

Opis

Convafort to produkt przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach. Skuteczność Convafort opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Convafort zawiera glikozydy kardenolidowe konwalii, które wzmacniają siłę skurczu mięśnia sercowego.

Wskazanie:

Convafort stosuje się wspomagająco w początkowym stadium upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej stosowania innych leków, bez objawów zastoiny krążenia i w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Dawkowanie - Convafort, 40 drażetek:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle dorosłym i młodzieży powyżej 12 lat zaleca się od 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy dziennie, 15 minut przed posiłkiem.

W leczeniu skojarzonym ze strofantyną, preparat można podawać w odstępach 9 godzin przed i 8 godzin po iniekcji strofantyny.

Składniki - Convafort, 40 drażetek

1 tabletkę drażowaną zawiera:

Substancja czynna:

Wyciąg suchy z konwalii -15,7 mg

Substancje pomocnicze:

Laktoza jednowodna, sacharoza, talk, stearynian magnezu, guma arabska, olej rycynowy, skrobia ziemniaczana, celacefat
Opakowanie zawiera 30 tabletek drażowanych

Przeciwwskazania - Convafort, 40 drażetek

Nie należy stosować preparatu w przypadku, gdy występują:

-nadwrażliwość na składniki preparatu,
-hipokaliemia (niedobory potasu),
-hiperkalcemia (nadmiar wapnia w organizmie)
-zaburzenia przewodnictwa serca, np.: częstoskurcz komorowy, migotanie komór serca, blok przedsionkowo-komorowy, itp.

Zachować szczególną ostrożność jeśli:

Nie występuje poprawa lub nasilają się dolegliwości związane z niewydolnością krążenia, np.: następuje gromadzenie płynu w organizmie, objawiające się obrzękami nóg, należy wówczas zwrócić się do lekarza, który zdecyduje o dalszej terapii.

Ważne!

Jeżeli wystąpiły objawy poważnej niewydolności serca: ból w okolicy serca rozszerzający się w kierunku ramienia, ból w górnej części jamy brzusznej, ból w okolicy szyi, wystąpienie duszności – należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Przeciwwskazania - Convafort, 40 drażetek

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Jednak, jak każdy lek, Convafort może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.