

Corsodyl Miętowy, 0,2%, roztwór 300 ml



Nasza cena: 27,25 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,2%
Opakowanie	300ml
Postać	ROZT.
Producent	SMITH-KLINE-BEECHAM WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CHLORHEXIDINUM

Opis produktu

Opis

Corsodyl Miętowy, 0,2%, roztwór 300 ml

Płyn do stosowania w jamie ustnej Corsodyl zawiera glukonian chlorheksydyny o działaniu przeciwbakteryjnym.

Dawkowanie

2 x dziennie, najlepiej rano i wieczorem po jedzeniu i umyciu zębów płukać jamę ustną 10 ml roztworu (do kreski wewnątrz zakrętki).

W przypadku ostrego zapalenia dziąseł lub śluzówki jamy ustnej, leczenia aft oraz zapalenia dziąseł spowodowanego przez protezy, zaleca się płukać jeszcze przez 2 dni po ustąpieniu objawów. Przed zabiegiem chirurgicznym w jamie ustnej używać roztworu według wskazań lekarza.

Skład

0,2% w/v roztwór glukonianu chlorheksydyny
substancje pomocnicze: etanol 96%, glicerylohydroksystearynian makrogolu, sorbitol 70%, aromat na bazie olejku mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

Działanie

- odkażające
- przeciwbakteryjne

Wskazania

- leczenie ostrego zapalenia dziąseł,
- leczenie infekcyjnego zapalenia śluzówki jamy ustnej, w tym także kandydoz,
- wspomaganie gojenia po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej,
- profilaktyka zębodołów poekstrakcyjnych,
- intensywna terapia chronicznych aft,
- utrzymanie higieny jamy ustnej w sytuacjach, kiedy czasowo niemożliwe jest czyszczenie zębów szczoteczką.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu w razie stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Możliwe działania nieporządane

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Przebarwienia: może wystąpić powierzchniowe przebarwienie języka, które ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Mogą również wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Zabarwienie to nie jest trwałe i można mu w znacznym stopniu zapobiec poprzez codzienne szczotkowanie zębów pastą do zębów przed zastosowaniem płynu. lub w przypadku protez, czyszczenie ich środkiem do czyszczenia protez. Jednakże w pewnych przypadkach aby całkowicie usunąć plamy może być konieczne profesjonalne polerowanie zębów.

Smak: w początkowym okresie używania płynu do stosowania w jamie ustnej mogą wystąpić przejściowe zaburzenia zmysłu smaku oraz odczuwanie pieczenia języka. Oddziaływanie to zazwyczaj słabnie przy dalszym stosowaniu płynu.

Złuszczenie się błon śluzowych jamy ustnej: w przypadku wystąpienia złuszczenia błony śluzowej jamy ustnej, należy rozcieńczyć płyn taką samą ilością wody i wymieszać, co często pozwala na dalsze jego stosowanie.

Obrzęk ślinianek przyusznych: w niezmiernie rzadkich przypadkach zgłaszano obrzęk ślinianek przyusznych podczas stosowania płynów do płukania ust zawierających chlorheksydyne. We wszystkich przypadkach ustępował on po zaprzestaniu kuracji.

Reakcje podrażnienia skóry: rzadko mogą występować reakcje objawiające się podrażnieniem skóry na preparaty zawierające chlorheksydyne. Zgłaszano nadwrażliwość i uogólnione reakcje uczuleniowe na chlorheksydyne jednakże są one niezwykle rzadkie.

Uwagi

Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.