

Curatoderm 4,17 µg/g maść 20 g

Nasza cena: 87,23 zł

Opis słownikowy

Dawka	4,17MCG/G
Opakowanie	*20G
Postać	MASC
Producent	ALMIRALL HERMAL GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TACALCITOLUM

Opis produktu

Opis

Curatoderm ma postać maści. Lek Curatoderm wskazany jest do stosowania w łagodnej lub umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej. Takalcytol – substancja czynna leku Curatoderm jest analogiem witaminy D3. Hamuje nadmierny rozrost naskórka, wspomaga prawidłowy proces rogowacenia i modyfikuje procesy zapalne.

Kiedy nie stosować tego leku?

- jeśli pacjent ma uczulenie na takalcytol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma łuszczycę krostkową lub grudkową
- jeśli pacjent ma schorzenia przebiegające z zaburzeniami metabolizmu wapnia
- jeśli pacjent ma ciężkie schorzenia wątroby, nerek lub serca. Nie należy stosować leku na zmiany rumieniowe sączące, jeżeli jest z tym związana wyraźna okluzja. Leku Curatoderm nie należy stosować łącznie z lekami zawierającymi kwas salicylowy

Jak stosować lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeżeli lekarz nie zalecił innego dawkowania:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Niewielką ilość maści smarować raz na dobę na chorobowo zmienioną skórę. Podczas kuracji trwającej do 8 tygodni, stosowana ilość leku Curatoderm nie powinna być większa niż 10 g na dobę a leczona powierzchnia nie powinna przekraczać 15 % całkowitej powierzchni ciała. W przypadku kuracji trwającej maksymalnie 18 miesięcy stosowana ilość leku Curatoderm wynosi 2- 3,5 g maści na dobę i nie powinna przekraczać 10% całkowitej powierzchni ciała. Okres leczenia zależy od stopnia nasilenia zmian i jest ustalany przez lekarza. Wskazane jest stosowanie maści wieczorem, przed snem. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład:

- Substancją czynną leku jest takalcytol jednowodny. Jeden gram leku zawiera 4,17 µg takalcytolu jednowodnego.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: diizopropylu adypinian, parafina ciekła, wazelina biała (zawierająca butylohydroksytoluen E 321)

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.