

Cynarex, 30 tabletek

Nasza cena: 14,85 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	HERBAPOL-WROCŁAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CYNARA SCOLYMUS

Opis produktu

Opis

Cynarex, 30 tabletek

Preparat stosowany pomocniczo w uszkodzeniu miększu wątroby, przy podwyższonym stężeniu cholesterolu, w miażdżycy.

Działanie

- żółciotwórcze
- żółciopędne
- obniża stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi
- ochronnie na wątrobę

Wskazania

Tradycyjnie stosuje się w niestrawności, osłabieniu wydzielania żółci. Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi (profilaktyka miażdżycy) oraz tradycyjnie jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla).

Dawkowanie

Doustnie, dorośli i młodzież powyżej 14 lat: w niestrawności jednorazowo 2 tabletki, pomocniczo w hipercholesterolemii lub jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla) 3 razy dziennie po 2 tabletki.

Skład

(1 tabletki): Cynarae herbae extractum siccum (3-5:1) - 250 mg (ekstrahent: etanol v/v)
substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu, krospowidon, magnezu stearynian, talk.

1 tabletki zawiera nie mniej niż 4,5mg polifenolokwasów w przeliczeniu na kwas kawowy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (Compositae=Asteraceae) i niedrożność dróg żółciowych.

W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. osoby, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinny poradzić się lekarza.

Dzieci poniżej 14 roku życia.

Możliwe działania nieporządane

Alergia kontaktowa u osób uczulonych na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na karczochy, niedrożność dróg żółciowych, kamicy żółciową, nietolerancję niektórych cukrów. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. W okresie ciąży i karmienia piersią stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.