

D-Vitum forte 2000 j.m. K2, 120 kapsułek



Nasza cena: 69,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*120
Postać	kapsułki
Producent	OLEOFARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

D-Vitum forte 2000 j.m. K2 to suplement diety zawierający olej lniany o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, do których należy kwas alfa-linolenowy (ALA). Pomaga on w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Preparat przeznaczony **dla osób dorosłych** w celu uzupełniania diety w witaminy D i K oraz kwasy tłuszczowe omega-3.

SKŁADNIKI

wysokolinolenowy olej z nasion lnu (*Linum usitatissimum*) tłoczony na zimno, żelatyna (składnik otoczki), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, menachinon (witamina K), cholekalcyferol (witamina D).

Składnik	1 kapsułka (%RWS*)
Witamina K	75 µg (100%)
Witamina D	50µg (2000j.m.) (1000%)
Olej z nasion lnu, w tym kwas alfa-linolenowy (omega-3)	191 mg 95 mg

*%RWS - referencyjna wartość spożycia

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, a także w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu. Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi i bierze udział w procesie podziału komórek. Wspiera również prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

MASA NETTO

30 g

ZAŁECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

OSTRZEŻENIA

Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol).

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.