

## Daktarin, aerozol, 2%, 100g



Nasza cena: 55,20 zł

### Opis słownikowy

Dawka	2%
Opakowanie	100 g
Postać	AEROZOL
Producent	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V. BELGIA [BE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MICONAZOLUM

### Opis produktu

#### Opis

Daktarin zawiera Mikonazol który łączy działanie przeciwgrzybicze przeciw dermatofitom i drożdżakom z działaniem przeciwbakteryjnym przeciwko bakteriom Gram-dodatnim.

#### Dawkowanie - Daktarin, aerozol, 2%, 100g

Na zmienione chorobowo miejsca na skórze, zwykle 2 razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć. czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych.

#### Składniki - Daktarin, aerozol, 2%, 100g

1 g pudru w aerozolu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Substancje pomocnicze: talk, hectoritu stearalkonian (bentone27), sorbitanu seskwiolelnian (arlacel 83), etanol, propellent butane 40 (25% propanu, 20% izopropanu, 55% n-butanu).

#### Działania

Mikonazol hamuje biosyntezę ergosterolu w ścianie komórkowej grzybów, co prowadzi do jej uszkodzenia i w konsekwencji do obumarcia komórki grzyba. Mikonazol jest również skuteczny w leczeniu grzybic nadkażonych bakteryjnie. Mikonazol bardzo szybko likwiduje świąd, często towarzyszący infekcjom wywołanym przez dermatofity i drożdżaki. Świąd ustępuje przed pojawieniem się pierwszych oznak wyleczenia. Mikonazol po zastosowaniu zewnętrznym nie powoduje zmian w morfologii krwi.

#### Wskazania - Daktarin, aerozol, 2%, 100g

Preparat stosowany w grzybicy międzypalcowej stóp ("stopa sportowca") oraz w grzybicy pachwin."

### Przeciwwskazania - Daktarin, aerozol, 2%, 100g

- nadwrażliwość na mikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
- leczenie grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci oraz zranionej skóry

### Przeciwwskazania - Daktarin, aerozol, 2%, 100g

Bardzo rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości w tym ciężkie, jak reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę, ponadto kontaktowe zapalenie skóry, wysypkę, rumień, uczucie palenia na skórze, zaburzenia w miejscu podania, w tym podrażnienie.

### Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**