

Daneb 5 mg 28 tabletek

Nasza cena: 5,27 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	S-LAB SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	NEBIVOLOLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania - Daneb 5 mg 28 tabletek

Lek jest zalecany do stosowania podczas :

- nadciśnienie samoistne
- niewydolność serca

Stosowany u pacjentów w wieku podeszłym po 70 roku życia jako uzupełnienie leczenia standardowego.

Dawkowanie - Daneb 5 mg 28 tabletek

Stosować według wskazań lekarza prowadzącego. Lek można przyjmować niezależnie od spożywanych posiłków , popijając szklanką wody.

Nadciśnienie : dorośli: dawka wynosi 1 tabletkę 5 mg dobową, najlepiej przyjmowaną o stałej porze każdego dnia.

Przewlekła niewydolność serca: dorośli dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę , zwiększana stopniowo co 1-2 tygodnie do osiągnięcia maksymalnej dawki ,10 mg na dobę

Leku nie zaleca się stosować u dzieci oraz młodzieży poniżej 18-tego roku życia, z braku danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Działanie

Lek działa na zmniejszenie częstotliwości rytmu serca oraz siły jego skurczu , prowadząc do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Nebivolol wykazuje działanie rozszerzające naczynia krwionośne, działa przeciwnadciśnieniowo.

Skład

1 tabletkę zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodoru.

Przeciwwskazania - Daneb 5 mg 28 tabletek

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Dodatkowo nie należy stosować leku gdy występuje u pacjenta niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby, zespół chorej nerki, blok serca II i III stopnia, astma oskrzelowa, kwasnica metaboliczna, niedociśnienie tętnicze, ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.

Działania niepożądane

Podczas stosowania nebiwololu szczególnie w początkowej fazie przyjmowania mogą pojawić się działania niepożądane takie jak: zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia widzenia. Mogą one stwarzać niebezpieczeństwo podczas obsługi maszyn oraz prowadzenia pojazdów.

Inne działania niepożądane podczas leczenia to: duszność, zaparcia, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.