

## Debelizyna, pasta 100 g



Nasza cena: 24,57 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	100 g
Postać	PASTA
Producent	HERBAPOL-WARSZAWA/PRUSZKÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DOLICHOS BIFLORUS

### Opis produktu

#### Opis

Środek tradycyjnie stosowany jako pomocniczy w kamicy dróg moczowych i profilaktyce kamicy dróg moczowych.

#### Dawkowanie - Debelizyna, pasta 100 g

Przeciętnie 3 razy dziennie po 1 łyżeczce pasty rozpuszczonej w 1/2 szklanki przegotowanej wody. Zalecenia dodatkowe dotyczące stosowania:

- w zależności od zaleceń lekarza, należy przestrzegać zalecanej diety oraz przyjmowania odpowiedniej ilości płynów;
- w przypadku stosowania leku w celach profilaktycznych częstość kontroli należy ustalić z lekarzem.

#### Składniki - Debelizyna, pasta 100 g

Wyciąg płynny z nasion fasoli indyjskiej - 65,45g (Dolichosi biflorum seminis extr. 65,45g).

Składniki - Debelizyna, pasta 100 g pomocnicze: Gliceryna (Glycerolum), Aseptyna M (Aseptina M), Aseptyna P (Aseptina P), Olejek pomarańczowy (Aurantii oleum), Kwas cytrynowy (Citricum acidum), Skrobia pszeniczna (Tritici amyllum), Agar (Agar) - do 100g.

#### Działania

Debelizyna działa moczopędnie i rozkurczająco na drogi moczowe, zmniejsza nasilenie dolegliwości związanych z kamicy nerkową (kolki, dolegliwości bólowe).

#### Wskazania - Debelizyna, pasta 100 g

Środek tradycyjnie stosowany jako wspomagający w kamicy dróg moczowych (drobne złogi) o niewielkim nasileniu i zapobieganiu nawrotom kamicy.

### Przeciwwskazania - Debelizyna, pasta 100 g

Nie stosować u osób uczulonych na Nipaginy lub na którykolwiek składnik pasty; u dzieci i młodzieży oraz pacjentów w podeszłym wieku bez konsultacji z lekarzem.

### Przeciwwskazania - Debelizyna, pasta 100 g

Nie stwierdzono.

### Uwagi

W przypadku kamicy nerkowej o skuteczności leczenia decyduje diagnostyka urologiczna, dlatego zaleca się konsultację lekarską. Jeśli pominięto dawkę leku, nie należy stosować dawki podwójnej, lecz stosować następną dawkę w przewidzianym dla nie terminie.

Nie stosować u kobiet planujących ciążę oraz nie stosować w okresie ciąży.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**