

Deflegmin Junior, syrop, 15 mg/5ml, 120 ml



Nasza cena: 13,42 zł

Opis słownikowy

Dawka	15MG/5ML
Opakowanie	120 ml
Postać	SYROP
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AMBROXOLUM

Opis produktu

Opis

Lek o działaniu mukolitycznym.

Dawkowanie - Deflegmin, syrop, 15 mg/5ml, 120 ml

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- przez 2-3 dni: 10ml syropu 15mg/5ml lub 5ml syropu 30mg/5ml 3 razy dziennie, następnie te same dawki należy stosować 2 razy dziennie.

Dzieci w wieku od 6 do 12lat:

- 5ml syropu 15mg/5ml lub 2,5ml syropu 30mg/5ml 2 do 3 razy dziennie.

Dzieci w wieku od 1 do 2 lat:

- 2,5ml syropu 15mg/5ml lub 1,25ml syropu 30mg/5ml 2 razy dziennie.

Składniki - Deflegmin, syrop, 15 mg/5ml, 120 ml

5 ml syropu zawiera 15 mg lub 30 mg chlorowodoru ambroksolu.

Sorbitol, glicerol, glikol propylenowy, sodu benzoesan, woda oczyszczona, aromat maskujący, kwas solny 10%

Działania

Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, pobudza wytwarzanie surfaktantu płucnego oraz czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. Zwiększając wydzielanie płynów do drzewa oskrzelowego i poprawiając transport śluzu, ułatwia odkrztuszanie i

łagodzi kaszel.

Wskazania - Deflegmin, syrop, 15 mg/5ml, 120 ml

Preparat stosowany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania gęstej, nadmiernie lepkiej wydzieliny oskrzelowej, np. ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego zaostrzenia, astmatyczne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, rozstrzenia oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa.

Przeciwwskazania - Deflegmin, syrop, 15 mg/5ml, 120 ml

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przeciwwskazania - Deflegmin, syrop, 15 mg/5ml, 120 ml

Rzadko ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$):

- zgaga, niestrawność, zaparcia; reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$):

- nudności i wymioty; reakcje anafilaktyczne (obrzęk twarzy duszność, zwiększenie temperatury ciała, dreszcze).

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, choroby zapalne jelit, schorzenia nerek, masz osłabiony odruch kaszlowy lub zaburzenia mechanizmu oczyszczania oskrzeli z zalegającej wydzieliny. Gdy przyjmujesz preparaty przeciwkaszlowe (równoczesne stosowanie może prowadzić może do niebezpiecznego zastoju wydzieliny w drogach oddechowych wskutek ograniczenia odruchu kaszlowego), amoksycylinę, cefuroksym, erytromycynę, doksycyklinę (równoczesne stosowanie może prowadzić do nasilenia działania antybiotyku), teofilinę (chlorowodorek abroksolu i teofilina wzajemnie nasilają swoje działanie). Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Lek może być stosowany w ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.