

Deflegmin, syrop 30m/5 ml, 120 ml



Nasza cena: 15,01 zł

Opis słownikowy

Dawka	30MG/5ML
Opakowanie	120ml
Postać	SYROP
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AMBROXOLUM

Opis produktu

Opis

Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek

Inne składniki leku to: sorbitol roztwór, glicerol, glikol propylenowy, sodu benzoesan, woda oczyszczona, aromat maskujący, kwas solny 10% (do ustalenia pH)

Dawkowanie - Deflegmin, syrop 30m/5 ml, 120 ml

Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin w postaci syropu:

u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo, przez 2 do 3 dni, 10 ml syropu Deflegmin 15 mg/5 ml lub 5 ml syropu Deflegmin 30 mg/5 ml 3 razy na dobę, następnie te same dawki należy stosować 2 razy na dobę

u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 ml syropu Deflegmin 15 mg/5 ml lub 2,5 ml syropu Deflegmin 30 mg/5 ml 2 do 3 razy na dobę

u dzieci w wieku od 2 do 6 lat:

2,5 ml syropu Deflegmin 15 mg/5 ml lub 1,25 ml syropu Deflegmin 30 mg/5 ml 3 razy na dobę

u dzieci w wieku od 1 do 2 lat:

2,5 ml syropu Deflegmin 15 mg/5 ml lub 1,25 ml syropu Deflegmin 30 mg/5 ml 2 razy na dobę

Działania

Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania - Deflegmin, syrop 30m/5 ml, 120 ml

Preparat stosowany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania gęstej, nadmiernie lepkiej wydzieliny oskrzelowej, np. ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego zaostrzenia, astmatyczne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, rozstrzenia oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa.

Przeciwwskazania - Deflegmin, syrop 30m/5 ml, 120 ml

Uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przeciwwskazania - Deflegmin, syrop 30m/5 ml, 120 ml

Zaburzenia żołądka i jelit:

-rzadko: zgaga, niestrawność, zaparcia

-bardzo rzadko: nudności i wymioty

Zaburzenia układu immunologicznego:

-rzadko: reakcje alergiczne (przeważnie wysypki skórne)

-bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne (obrzęk twarzy, duszność, zwiększenie temperatury ciała, dreszcze)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.