

Demoxoft lipożel 15 ml



Nasza cena: 31,33 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Typ Produktu	Kosmetyk

Opis produktu

Opis

Demoxoft Lipożel do specjalistycznej ochrony i pielęgnacji powiek, pomaga w usuwaniu zalegających zanieczyszczeń i wydzieliny na powiekach i brzegach powiek.

Wskazanie:

- Specjalistyczna ochrona i pielęgnacja powiek w przypadku takich objawów jak świąd i podrażnienie
- Usuwanie zalegających zanieczyszczeń i wydzieliny na powiekach i brzegach powiek
- Łagodzenie objawów podrażnienia wywołanych przez różne czynniki zewnętrzne (takie jak np. nużeńce)

Działanie:

Demoxoft Lipożel, dzięki specjalnie dobranym składnikom nawilża wrażliwą skórę powiek i skutecznie pobudza procesy regeneracyjne oraz niweluje nieprzyjemne odczucie związane z wysuszeniem i uszkodzeniem naskórka. Dzięki zawartości aloesu łagodzi świąd i pieczenie towarzyszące stanom zapalnym. Dodatkowo D-panthenol (prowitamina B5) nadaje skórze elastyczność i łagodzi podrażnienia, a kwas hialuronowy wraz z Fucogelem® tworzą warstwę ochronną i zapewniają kompleksowe nawilżanie podrażnionej skóry. Składnik Olivem®1000 oparty na cennych właściwościach oliwy z oliwek wzmacnia barierę ochronną skóry.

Zalety produktu:

- Unikalny preparat przeznaczony do profesjonalnej ochrony i pielęgnacji brzegów powiek u pacjentów z przewlekłym zapaleniem brzegów powiek
- Innowacyjny skład opracowany przy współpracy z polskim ośrodkiem naukowym
- Pozytywne wyniki stosowania preparatów Demoxoft na objawy obiektywne i subiektywne u osób z przewlekłym zapaleniem brzegów powiek, wywołanym przez nużeńce
- Testowany okulistycznie

Składniki:

Składniki aktywne:

- D-pantenol
- Kwas hialuronowy
- Wyciąg z aloesu
- Olejek z szalwii hiszpańskiej
- Fucogel
- Olivem 1000

Produkt hipoalergiczny

Sposób użycia i zawartość opakowania

Demoxoft Lipożel należy stosować głównie na noc, najlepiej bezpośrednio przed snem.

W celu osiągnięcia najlepszego efektu działania rekomendowane jest stosowanie preparatu Demoxoft Lipożel przez 2 tygodnie, a następnie po 2 tygodniowej przerwie ponowne jego zastosowanie przez 2 tygodnie. Schemat ten można powtarzać.