

Dentosept A, płyn 25g



Nasza cena: 15,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	25 g
Postać	PLYN
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

W skład leku Dentosept A wchodzi wyciąg etanolowy złożony z koszyczka rumianku, kory dębu, liści szalwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku oraz benzokaina. Lek stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu znieczulającym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i odkażającym. Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie - Dentosept A, płyn 25g

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, smarować miejsce zmienione chorobowo w jamie ustnej za pomocą patyczka higienicznego 3 razy dziennie. Bezpośrednio po zastosowaniu leku nie płukać jamy ustnej.

Składniki - Dentosept A, płyn 25g

100 g produktu zawiera wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku, kory dębu, liści szalwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku (2/2/2/1/1/1/1).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V)- 50.0 g, benzokaina- 2,0 g.
Zawartość etanol 35-45% (v/v).

Działania

Znieczulające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i odkażające.

Wskazania - Dentosept A, płyn 25g

Lek tradycyjnie stosowany w:

- stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł
- aftach
- odleżynach w jamie ustnej (po protezach zębowych)
- pomocniczo w paradontozie

Przeciwwskazania - Dentosept A, płyn 25g

Nadwrażliwość na benzokainę, arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny Asteroceae. Dzieci poniżej 12 lat. Kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Przeciwwskazania - Dentosept A, płyn 25g

Przebarwienia zębów i śluzówki jamy ustnej przemijające po umyciu zębów. Przemijające jest również krótkotrwałe pieczenie błony śluzowej występujące bezpośrednio po zastosowaniu leku. Reakcje nadwrażliwości u osób uczulonych na benzokainę, methemoglobinemia.

Uwagi

Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę pomiędzy przyjęciem leku a prowadzenie pojazdu czy obsługą urządzeń w ruchu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.