

Depo-Medrol 40 mg/ml fiołka

Nasza cena: 7,62 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,04 G/1ML
Postać	FIOL.
Producent	PFIZER EUROPE WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	METHYLPREDNISOLONUM

Opis produktu

Opis

Wskazania do stosowania Depo-Medrol:

- przewlekła terapia hormonalna kory nadnerczy
- w leczeniu chorób skóry
- w zapaleniu stawów o podłożu reumatoidalnym
- w zapaleniu kaletki maziowej w jamie stawowej
- przy zapaleniu ścięgien

Dawkowanie:

W stosowaniu ogólnym Depo-Medrol

- wyłącznie głęboko domięśniowo,
- dawka 40-80 mg co 1-2 tygodnia,

- dawkę można zwiększać do 120 mg na tydzień, kiedy lekarz zdecyduje o takim trybie leczenia

W leczeniu miejscowym:

- dostawowo dawka 10 - 60 mg, która jest uzależniona od wielkości stawu i nasilenia stanu zapalnego
- jeśli lekarz zdecyduje, to kurację można powtórzyć co 1 - 3 tygodnia

Działanie:

- działanie przeciwzapalne
- działanie immunosupresyjnym
- działanie mineralokortykoidowe
- wywiera umiarkowany wpływ hamujący na podwzgórze i przysadkę mózgową

Efekt zastosowania leku występuje po 12-18 h od iniekcji. Natomiast ogólnoustrojowy wpływ metaboliczny i adaptacyjny utrzymuje się przez około 1-3 tyg.

Skład:

1 fiolka (1 ml) zawiera 40 mg octanu metyloprednizolonu.

Działanie niepożądane:

objawy zespołu Cushinga takie jak:

- zmiany torficzne skóry
- purpurowe rozstępy
- skaza naczyńniowa
- trądzik

- zmiana sylwetki ciała
- nadmierne owłosienie
- zanik mięśni
- nadciśnienie tętnicze
- hipokaliemia
- osteoporoza
- impotencja
- zaćma
- jaskra
- owrzodzenie żołądka
- zapalenie trzustki

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.