

# Deprexolet 10 mg 30 tabletek

Nasza cena: 2,65 zł

## Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLFA PABIANICE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	MIANSERINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Produkt jest wskazany do leczenia zespołu depresyjnego.

### Dawkowanie:

- zazwyczaj stosuje się dawkę wynoszącą 30 mg na dobę w pojedynczej dawce wieczornej lub w dawkach podzielonych,
- dawka podtrzymująca wynosi od 30 do 90 mg na dobę,
- w szczególnych wypadkach istnieje konieczność zwiększenia dawki,
- leczenie przeciwdepresyjne należy kontynuować przez co najmniej kilka miesięcy (najczęściej od 4 do 6).

### Działanie:

- wykazuje właściwości uspokajające,
- wykazuje istotne działanie antycholinergicznego,
- przeciwdepresyjne,
- nasenne.

### Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg chlorowodoru mianseryny.

## Przeciwwskazania:

### Produkt leczniczy jest przeciwwskazany:

- u pacjentów z nadwrażliwością na mianserynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
- podczas równoczesnego stosowania takich leków, jak inhibitory MAO
- jeśli u pacjenta stwierdzono stan pobudzenia maniakalnego;
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie uszkodzenie wątroby.

## Działania niepożądane:

### Do najczęstszych działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku można zaliczyć:

- senność,
- uspokojenie występujące na początku leczenia,
- niedociśnienie ortostatyczne,
- zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych,
- obrzęki.

Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub też zaczerpnąć informacji u farmaceuty.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.