


Deprim, 30 tabletek



Nasza cena: 17,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Sandoz Gmbh Kundl
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Deprim - lek o działaniu łagodzącym nastroje stanu depresyjnego.

Dawkowanie - Deprim, 30 tabletek

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki 3 do 4 razy dziennie. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Tylko pod kontrolą lekarza, 3 do 4 tabletek dziennie, rano lub w południe. Lek należy przyjmować podczas posiłków popijając odpowiednią ilością wody.

Składniki - Deprim, 30 tabletek

1 tabletki zawiera 60 mg wyciągu z dziurawca oraz substancje pomocnicze w tym laktozę.

Działania

Preparat łagodzi stany obniżonego nastroju typu depresyjnego z towarzyszącymi im objawami, takimi jak: brak motywacji do działania, zaburzenia koncentracji, uczucie wyczerpania, zaburzenia snu. Stosowany w stanach obniżonego nastroju. Zawiera suchy wyciąg z dziurawca.

Wskazania - Deprim, 30 tabletek

Łagodne zaburzenia nastroju, zmniejszenie zainteresowania podejmowaniem codziennych czynności, uczucie obniżenia energii.

Przeciwwskazania - Deprim, 30 tabletek

Nie stosować:

Przy nadwrażliwości na lek lub na promieniowanie słoneczne.

Preparatu Deprim nie należy stosować w cięższej niż opisana depresji

Jeśli pacjent przyjmuje indynawir lub inne leki zwalczające zakażenia wywołane przez retrowirusy, digoksynę, teofilinę, irynotekan,

cyklosporynę, takrolimus, symwastatynę, feksofenadynę, warfarynę i inne pochodne kumaryny, leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane w leczeniu migreny lub inne leki przeciwdepresyjne.

Jeśli pacjentka przyjmuje doustne leki antykoncepcyjne, zastrzyki antykoncepcyjne, lub posiada wszczepiony implant hormonalny

U dzieci poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania - Deprim, 30 tabletek

Rzadko: zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość śluzówek jamy ustnej, uczucie zmęczenia, skórne objawy nadwrażliwości (zaczerwienienie, świąd), objawy zmęczenia i niepokoju.

Bardzo rzadko: U osób nadwrażliwych na promieniowanie słoneczne, opalanie może powodować reakcje podobne do oparzenia.

Uwagi

Brak danych odnośnie szkodliwego wpływu wyciągów z dziurawca stosowanych podczas ciąży i laktacji. Bez zgody lekarza nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.