

Desmoxan 1,5mg, 100 tabletek

Nasza cena: 83,92 zł



Opis słownikowy

Dawka	1,5 MG
Opakowanie	*100
Postać	Tabletki
Producent	AFLOPA - PABIANICE POLSKA
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CYTISINUM

Opis produktu

Opis

Desmoxan 1,5mg, 100 tabletek

Wskazania:

Desmoxan to lek zalecany w leczeniu uzależnienia nikotynowego.

Zawarta w składzie substancja czynna - cytozyna wykazuje działanie podobne do nikotyny. Sukcesywnie wypiera nikotynę z organizmu zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na ten uzależniający związek aż do momentu całkowitego zaprzestania używania produktów nikotynowych. Nie powoduje objawów odstawienia zwanych potocznie głodem nikotynowym.

Dawkowanie:

Przez 3 pierwsze dni stosować po 1 kapsułce co 2 godziny (6 kapsułek na dobę). Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów. Jeśli leczenie nie dało efektów i nadal odczuwasz potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku Desmoxan. Leczenie można rozpocząć ponownie po 2-3 miesiącach. Jeśli leczenie jest skuteczne i nie odczuwasz potrzeby palenia tytoniu, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

- od 4 do 12 dnia - 1 kapsułka co 2,5 godziny (maksymalnie 5 kapsułek na dobę);
- od 13 do 16 dnia - 1 kapsułka co 3 godziny (maksymalnie 4 kapsułki na dobę);
- od 17 do 20 dnia - 1 kapsułka co 5 godzin (maksymalnie 3 kapsułki na dobę);
- od 21 do 25 dnia - 1 lub 2 kapsułki na dobę.

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym wypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego efektu

leczeni

Przeciwwskazania:

Nie zaleca się stosowania leku w przypadku osób uczulonych na substancję czynną leku - cytozynę, a także z zaburzeniami rytmu serca, po zawale serca lub udarze mózgu, z zaburzeniami drożności tętnic, w przypadku nadciśnienia tętniczego. Stosowanie leku jest przeciwwskazane również w przypadku osób cierpiących na choroby układu pokarmowego takie, jak choroba żołądka, dwunastnicy i refluks. Kapsułek Desmoxan nie powinny zażywać też kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci, i młodzież poniżej 18-go, i osoby powyżej 65-go roku życia.

Składniki:

1 kapsułka zawiera 1,5mg cytozyny oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu. Skład kapsułki twardej: dwutlenek tytanu (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Decyzja o stosowaniu leku powinna być podyktowana poważną deklaracją o zaprzestaniu palenia tytoniu. W wyjątkowej sytuacji całkowita rezygnacja z palenia powinna nastąpić najpóźniej 5 dnia od rozpoczęcia leczenia. W przeciwnym razie, palenie tytoniu przy jednoczesnym zażywaniu leku może spowodować wzrost niepożądanych reakcji i nasilenie działania nikotyny, a tym samym jeszcze większe trudności w zaprzestaniu palenia wyrobów tytoniowych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.