


# DETRITIN 4000 j.m., 90 tabletek powlekanych

Nasza cena: 39,09 zł



## Opis słownikowy

|                   |  |
|-------------------|--|
| Dawka             | 0,1 MG D3 4000 J.M.                      |
| Opakowanie        | *90                                      |
| Postać            | TABL.POWL.                               |
| Producent         | N.P.PHARMA OSTRÓW MAZOWIECKI POLSKA [PL] |
| Rejestracja       | Lek bez recepty                          |
| Substancja czynna | VITAMINUM D                              |

## Opis produktu

### OPIS

Detritin 4000 IU (jednostek międzynarodowych) zawiera cholekalcyferol - substancję analogiczną do witaminy D wytwarzanej w organizmie człowieka pod wpływem promieniowania słonecznego. Uczestniczy w bardzo wielu procesach m.in. przemiany materii, wspomaga budowę kości. Przeznaczony jest dla osób dorosłych.

### SKŁAD

Substancją czynną jest cholekalcyferol (witamina D3).

Każda tabletkę powlekana zawiera 40 mg Cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,100 mg (4000 IU) Cholekalcyferolu (witamina D3). Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: cholekalcyferol, proszek o składzie: cholekalcyferol, sodu askorbinian, all-rac- $\alpha$ -tokoferol, skrobia modyfikowana kukurydziana, sacharoza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna; substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (Typ 102), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian; otoczka AquaPolish P white 014.95 MS o składzie: hypromeloza 15 mPa.s, hypromeloza 6 mPa.s, tytanu dwutlenek (E 171), talk, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, hydroksypropyloceluloza 100 mP.s.

### DZIAŁANIE LEKU

Witamina D reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową, przez co wpływa m.in. na procesy kostnienia, zapobiega krzywicy i osteomalacji. Jest prekursorem hormonów steroidowych.

### DAWKOWANIE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 1 kapsułka na dobę w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Tabletkę należy zażyć, popijając wystarczającą ilością wody.

### WSKAZANIA

Lek Detritin jest wskazany do stosowania w profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u osób

dorosłych z otyłością.

#### PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub którykolwiek składnik produktu leczniczego oraz w przypadku hiperkalcemii, hiperkalcetrii, kamicy nerkowej, nefrokalcynozy, ciężkiej niewydolności nerek i hiperwitaminozy D oraz rzekomej niedoczynności przytarczyc.

#### DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000): podwyższone stężenia wapnia we krwi i/lub moczu.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): wysypka, świąd, pokrzywka.

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, biegunka.

#### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc, sarkoidozy, ciężkiej niewydolności nerek, kamicy nerkowej, wysokiej ekspozycji na słońce, kuracji długotrwałej oraz jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe lub/i leki moczopędne.

Podczas długotrwałego stosowania tego leku należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy, wydalanie wapnia z moczem i czynność nerek poprzez pomiar stężenia kreatyniny w surowicy.

Lek Detritin zawiera sacharozę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków przeciwdrgawkowych, barbituranów, diuretyków tiazydowych, glikokortykosteroidów, glikozydów nasercowych, żywic jonowymiennych, niektórych leków przeczyszczających, przeciwgrzybiczych i przeciwgruźliczych, aktenomycyny oraz preparatów stosowanych w leczeniu hiperkalcemii i zawierających magnez i glin (leki zobojętniające w chorobie refluksowej i wrzodowej).

#### CIĄŻA I KARMIEŃ PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Detritin jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

#### STOSOWANIE U DZIECI

Lek Detritin jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

#### PRZECHOWYWANIE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**