

DexaCaps kapsułki twarde, 10 szt



Nasza cena: 11,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	KAPS.
Producent	HERBAPOL-LUBLIN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TILIA PLATYPHYLLOS, MELISSA OFFICINALIS,

Opis produktu

Opis

DexaCaps zawiera w swoim składzie bromowoderek dekstrometofanu oraz substancje wykazujące działanie wspomagające: wyciągi suche z kwiatostanu lipy i ziela melisy. Dekstrometofan jest środkiem przeciwkaszlowym. Jego działanie polega na hamowaniu ośrodka kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość ataków suchego kaszlu.

Dawkowanie - DexaCaps kapsułki twarde, 10 szt

Doustnie.

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie 1 kapsułkę po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanego dziennego dawkowania.

Składniki - DexaCaps kapsułki twarde, 10 szt

(1 kapsułka):

- Wyciąg suchy z kwiatostanu lipy (2,5-3:1)- 167,0mg (nośnik: maltodekstryna do 30%) (rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% v/v)
- Wyciąg suchy z ziela melisy (6-8:1)- 50,0 mg (rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona)
- Bromowoderek dekstrometofanu- 20.0mg.

Substancje pomocnicze:

Skrobia żelowana kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

W skład kapsułki żelowanej pustej wchodzi: żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek, żelatyna.

Działania

Działanie polega na hamowaniu ośrodka kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość ataków suchego kaszlu.

Wskazania - DexaCaps kapsułki twarde, 10 szt

W stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Przeciwwskazania - DexaCaps kapsułki twarde, 10 szt

Leku nie stosować u dzieci do 12 lat.

Leku nie należy stosować u osób z nadwrażliwością na jego składniki, w kaszlu z dużą ilością wydzieliny, w astmie oskrzelowej, ciężkich schorzeniach wątroby, przy jednoczesnym przyjmowaniu inhibitorów monoaminooksydazy i leków mukolitycznych.

Przeciwwskazania - DexaCaps kapsułki twarde, 10 szt

Sporadycznie mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne, senność, zawroty głowy oraz objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak: mdłości, wymioty.

Interakcje

Nie zaleca się stosowania leku równocześnie z inhibitorami MAO ze względu na potęgowanie ich działania przez dekstrometorfan, co objawia się sennością, nudnościami, wysoką gorączką oraz podwyższeniem ciśnienia tętniczego krwi. Po odstawieniu inhibitorów MAO należy zachować 14 dniowy odstęp czasowy przed zastosowaniem leku. Lek wywołuje interakcje z hormonami tarczycy powodując osłabienie ich działania. Równoczesne podawanie leku z chinidyną może wpływać hamująco na metabolizm dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększając jego stężenie w surowicy krwi. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ze względu na możliwość wystąpienia senności należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.