

Dexamytrex 3 g maść do oczu

Nasza cena: 22,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	3g
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	GENTAMICINUM, DEXAMETHASONUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Zakażenia przedniego odcinka oka, takie jak: zapalenie worka spojówkowego, rogówki, zapalenie brzegów powiek połączone z silnym stanem zapalnym, zakażenia okołoooperacyjne, zapalenia alergiczne oka.

Dawkowanie:

Krople: 4-6x dziennie 1 kroplę do worka spojówkowego. Maść: 2-3x dziennie oraz przed snem, wprowadzając 5 mm pasek maści do zachyłka powieki dolnej. Czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 14 dni. Należy kontrolować jego postępy oraz sprawdzać ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Uwagi:

Należy kontrolować postępy leczenia oraz sprawdzać ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Przeciwwskazania:

Ostre ropiejące choroby przedniego odcinka oka, powierzchniowe opryszczkowe zapalenie rogówki, zranienia i owrzodzenia rogówki, gruźlica oka, grzybice oka. Ponadto: nadwrażliwość na deksametazon i gentamycynę lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą.

Ciąża i laktacja:

Preparat można stosować u kobiet w ciąży jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści dla zdrowia matki przewyższają ryzyko dla zarodka lub płodu. Nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane:

Przemijające pieczenie oczu. Przy długotrwałym stosowaniu istnieje ryzyko wystąpienia jaskry i rozwoju zaćmy.

Działanie:

Preparat złożony zawierający: antybiotyk aminoglikozydowy gentamycynę - o działaniu bakteriobójczym i glikokortykosteroid fosforan deksametazonu - o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Fosforan deksametazonu wykazuje zmienną, zależną od stopnia uszkodzenia nabłonka rogówki przenikalność do komory przedniej oka. W przypadku uszkodzenia nabłonka rogówki lub w stanach zapalnych jego przenikalność jest bardzo wysoka. Maleje stopniowo wraz z gojeniem się rogówki lub ustępowaniem stanu zapalnego.

Skład:

1 ml roztworu zawiera 3 mg siarczanu gentamycyny i 1 mg soli dwusodowej diwodorofosforanu deksametazonu. Substancje pomocnicze: cetrymid, jednowodorowy fosforan sodu, dwuwodorowy fosforan potasu, dwusiarczyn sodu, glicerol, poli-1-winylo-pirolidon, metylohydroksypropyloceluloza i sól dwusodowa EDTA. 1 g maści zawiera 3 mg siarczanu gentamycyny i 0,3 mg deksametazonu. Substancje pomocnicze: chlorobutanol 1 H₂O 3,1 mg, alkohol mirystylowy, lanolina, parafina, wazelina biała, DL- α -tokoferol, butylohydroksytoluol, palmitynian askorbylu, jednowodzien kwasu cytrynowego, monostearynian glicerolu, 1,2-propylen glikolu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.