

Dexapico, syrop przeciwkaszlowy, 115 ml



Nasza cena: 21,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	115 ml
Postać	SYROP
Producent	HERBAPOL-LUBLIN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TILIA PLATYPHYLLOS, DEXTROMETHORPHANUM

Opis produktu

Opis

Dexapico, syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

Dexapico lek przeciwkaszlowy w postaci syropu zawierający w swoim składzie bromowodrek dekstrometorfanu oraz wyciąg z kwiatostanu lipy.

Dawkowanie - Dexapico, syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

Doustnie.

Dzieci 2-6 lat: 3 razy dziennie 2,5 ml syropu

Dzieci 6-12 lat: 3 razy dziennie 5 ml syropu

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie 15 ml syropu.

Składniki - Dexapico, syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

100 g syropu zawiera:

Wyciąg wodny z kwiatostanu lipy (1:5) 25 g

Dekstrometorfanu bromowodrek 0,1 g

Substancje pomocnicze: sacharoza, zagęszczony sok aroniowy 65%, kwas cytrynowy jednowodny, sodu benzoesan, potasu sorbinian, aromat malinowy 7111, woda oczyszczona.

Działania

Dekstrometorfan jest środkiem przeciwkaszlowym. Jego działanie utrzymuje się przez 6-8 godzin, polega na hamowaniu ośrodka kaszlu

w ośrodkowym układzie nerwowym, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość suchego kaszlu.
Wyciąg z kwiatostanów lipy łagodzi podrażnienia górnych dróg oddechowych wywołane kaszlem.

Wskazania - Dexapico, syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

W stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Przeciwwskazania - Dexapico, syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jego składniki, kaszlu z dużą ilością wydzieliny, astmy, ciężkich schorzeń wątroby, przy jednoczesnym przyjmowaniu inhibitorów monoaminooksydazy i leków mukolitycznych.
Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Przeciwwskazania - Dexapico, syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

Sporadycznie mogą wystąpić: skórne reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka), senność, zawroty głowy oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak mdłości czy wymioty.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:
Nie stosować u kobiet w ciąży i kobiet karmiących.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.