

Dextin 25 mg, 10 tabletek powlekanych

Nasza cena: 14,26 zł



Opis słownikowy

Dawka	25 MG
Opakowanie	*10
Postać	TABL.POWL.
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DEXKETOPROFENUM

Opis produktu

Opis

Dextin to lek przeciwbólowy należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosuje się go w celu krótkotrwałego leczenia bólu nasilającego się w sposób łagodny do umiarkowanego. Lek Dextin łagodzi m.in. bóle mięśni, zębów, czy bolesne miesiączkowanie.

Wskazania:

Krótkotrwałe (do 10 dni) leczenie bólu o łagodnym do umiarkowanego nasileniu.

Łagodzenie bólu:

- mięśni
- zębów
- bolesnego miesiączkowania.

Dawkowanie:

Dorośli: w zależności od typu, stopnia zaawansowania i czasu trwania bólu, wymagana dawka leku wynosi pół tabletki (12,5mg) co 4-6 godzin lub 1 tabletkę (25mg) co 8 godzin. Nie przyjmować więcej niż 3 tabletki na dobę (75mg).

Lek ten należy przyjmować dokładnie w sposób opisany w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek Dextin przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów. U osób w podeszłym wieku lub z chorobami nerek lub wątroby zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej całkowitej dawki dobowej odpowiadającej nie więcej niż 2 tabletkom (50mg). W przypadku dobrej tolerancji u osób w podeszłym wieku tę dawkę początkową można następnie zwiększyć do dawki zalecanej dla ogólnej populacji (75mg). Tego leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na obuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
- Występowanie u pacjenta astmy lub pojawienie się napadów astmy w przeszłości lub ostrego alergicznego nieżytu nosa, polipów nosa, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, lub świszczącego oddechu po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
- Wystąpienie u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na światło: reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne podczas przyjmowania ketoprofenu lub fibratów
- Występowanie u pacjenta choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z żołądka lub jelit lub jeśli w przeszłości występowało takie krwawienie, owrzodzenie lub perforacja
- Występowanie u pacjenta przewlekłych zaburzeń trawiennych
- Wystąpienie u pacjenta krwawienia z żołądka lub jelit lub perforacje związane wcześniejszym przyjmowaniem leków z grupy NLPZ
- Występowanie u pacjenta chorób jelit, które przebiegają z przewlekłym stanem zapalnym
- Występowanie u pacjenta ciężkiej niewydolności serca, umiarkowanego lub ciężkiego zaburzenia czynności nerek lub ciężkiego zaburzenia czynności wątroby
- Nadmierna skłonność do krwawień lub zaburzeń krzepnięcia krwi u pacjenta
- Ciężkie odwodnienie pacjenta spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów
- Jeżeli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży lub karmi piersią

Składniki:

1 tabletkę zawiera: substancję czynną: deksketoprofen z trometamolem 36,90mg, co odpowiada 25mg deksketoprofenu, substancje dodatkowe: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), glicerolu distearynian, Otoczka (Otoczka Opadry Y-1-7000): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol/PEG 400.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.