

Diabetofort, płyn 100 g



Nasza cena: 18,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Postać	PLYN
Producent	LEKI NATURY POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Diabetofort, płyn 100 g

Diabetofort jest produktem leczniczym roślinnym w postaci płynu doustnego stosowany tradycyjnie w zaburzeniach oddawania moczu.

Dawkowanie - Diabetofort, płyn 100 g

płyn przeznaczony do podania doustnego. Dorośli i dzieci od 12 roku życia przyjmować 5 ml leku po posiłku do 4 razy na dobę. Odpowiednią dawkę rozcieńczyć małą ilością wody.

Składniki - Diabetofort, płyn 100 g

(100 ml): extractum compositum (1:1) fluidum ex.: Owocnia fasoli 30,0 g, liść brzozy 20,0 g, kłącze perzu 20,0 g, liść jeżyny fałdowanej 20,0 g, owoc róży 10,0 g. Zawiera 60-70% etanolu (v/v).

Działania

Moczopędne.

Wskazania - Diabetofort, płyn 100 g

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w zaburzeniach oddawania moczu. W porozumieniu z lekarzem preparat może być stosowany przez osoby z rodzinną predyspozycją do cukrzycy jako środek moczopędny zmniejszający tendencję do wzrostu cukru po posiłku.

Przeciwwskazania - Diabetofort, płyn 100 g

Nie należy stosować leku Diabetofort:

- Jeśli u pacjenta występują obrzęki wywołane niewydolnością serca lub nerek.
- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek.
- Jeśli u pacjenta występuje alkoholizm, padaczka, uszkodzenia mózgu lub choroby umysłowe.
- Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku.
- Nie należy stosować leku przez dłuższy czas. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania - Diabetofort, płyn 100 g

Jak każdy lek, Diabetofort może powodować działania niepożądane. U osób wrażliwych na wysokie zawartości tanoidów (garbników) mogą wystąpić nudności i wymioty.

Uwagi

Leku Diabetofort nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na zawartość etanolu (alkoholu etylowego) – 60-70%

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.

Podczas stosowania zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń w ruchu, Nie zaleca się przyjmowania produktu bezpośrednio przed podjęciem prowadzenia pojazdu, ponieważ alkohol może zostać wykryty w powietrzu wydychanym. W dawkach przekraczających zalecane może nastąpić osłabienie zdolności psychofizycznych, na skutek przyjęcia zwiększonej dawki etanolu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.