

Dicloratio Gel, 1%, 100 g



Nasza cena: 19,20 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 %
Opakowanie	100g
Producent	Ratiopharm GmbH
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Żel na ból i stany zapalne.

Dawkowanie - Dicloratio Gel, 1%, 100 g

Stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę, na bolące miejsca nałożyć cienką warstwę żelu, pozostawić do wchłonięcia. Nie należy wcierać.

Składniki - Dicloratio Gel, 1%, 100 g

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego, inne składniki leku to: adipinian diizopropyl, hydroksypropyloceluloza, kwas mlekowy, sodu pirosiarczyn, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Działania

Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Dicloratio gel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Wskazania - Dicloratio Gel, 1%, 100 g

- Dolegliwościach bólowych i stanach zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa
- Pourazowych stanach zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni, stawów
- Reumatyzmie pozastawowym (zapalenie ścięgien, pochewek ścięgien, kałek maziowych).

Przeciwwskazania - Dicloratio Gel, 1%, 100 g

- nadwrażliwość na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni.

Przeciwwskazania - Dicloratio Gel, 1%, 100 g

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala: wysypka skórna z pęcherzykami, pokrzywka, sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma), obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani

Inne działania niepożądane - mogą wystąpić podczas stosowania leku, są zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy, tak szybko jak to możliwe, poinformować lekarza lub farmaceutę: wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry, wrażliwość skóry na światło słoneczne.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.