

# DICLOREUM RETARD \*20 100MG

Nasza cena: 16,63 zł

## Opis słownikowy

Dawka	100MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	Alfa Wassermann S.p.a. Włochy [It]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	DICLOFENACUM

## Opis produktu

### Opis

### Skład:

1 tabletko o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg diklofenaku sodu (Diclofenacum natricum).

### Postać farmaceutyczna:

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

### Wskazania do stosowania:

Choroby stawów i tkanek okoławstawowych: reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie okoławstawowe, zapalenie ścięgien i kaletek maziowych, zapalenie ścięgien i mięśni, zespoły bólowe w wyniku zapalenia korzeni nerwowych. Pourazowe zespoły bólowe.

### Dawkowanie i sposób podawania:

#### Dorośli:

Zalecana dawka dobowo wynosi 100 mg. Tabletkę należy połknąć w całości, najlepiej w czasie posiłku.

Schemat dawkowania u osób w podeszłym wieku musi być ustalony przez lekarza, który powinien rozważyć zmniejszenie zalecanych dawek.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując produkt w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to koniecznie do kontrolowania objawów

## Dzieci i młodzież:

Ze względu na wielkość dawki, produkt leczniczy Dicloream Retard, nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

## Przeciwwskazania:

- znana nadwrażliwość na diklofenak lub którykolwiek inny składnik produktu leczniczego
- czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja
- krwawienie do przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszą terapią NLPZ lub nawroty choroby wrzodowej żołądka/krwawień w wywiadzie (dwa lub więcej epizodów ze stwierdzonym owrzodzeniem lub krwawieniem)
- ostatni trymestr ciąży
- ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca
- podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), nie należy stosować produktu leczniczego Dicloream Retard u osób, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego zapalenia błony śluzowej nosa.
- stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych.

## Działania niepożądane:

### Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza.

### Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym hipotensja i wstrząs)

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy).

### Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychiatryczne.

### Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowy

Rzadko: senność

Bardzo rzadko: parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu.

### Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenia, podwójne widzenie

### Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: zawroty głowy

Bardzo rzadko: szumy uszne, zaburzenia słuchu.

#### **Zaburzenia serca:**

Bardzo rzadko: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Częstość nieznana: zespół Kounisa

#### **Zaburzenia naczyniowe:**

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń.

Wszystkie działania niepożądane zostały szczegółowo opisane w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.